

286 細梗紅珠子	<i>Breynia vitis-idaea</i> (Burm.f.) C. E. C. Fischer	大戟科 Euphorbiaceae
別名	小葉黑面神。	
分布	台灣馴化野生於平地至低海拔山區之空曠地，中國南部等。	
形態	常綠灌木。株高 30~80cm，全株光滑無毛。莖直立，具淺縱溝和稜；下部分枝常一大一小併生，分叉點具 2 小托葉，分枝亦具淺縱溝和稜。單葉，互生；潤卵形；長 1~2cm，寬 0.5~1.2cm；基部圓形，先端鈍尖或圓形；全緣；表面綠色，背面灰綠色，具透明細點；托葉細小。花單性，雌雄同株，單生或 2~3 朵簇生於葉腋，白色，無花瓣；雄花梗細長，雄蕊 5，花絲合成柱狀；雌花梗細長，子房 3 室，花柱 3，各 2 歧，宿存。漿果扁球形，徑約 0.1cm，綠色。	
採集	全年採集全草，乾品。	
功效	全草具清熱解毒、消腫止痛、止咳平喘之效。(邱年永等，1995)	
主治	全草治感冒發熱、咽喉腫痛、氣管炎、腸炎腹瀉、濕疹膚癢、跌打腫痛等。(邱年永等，1995)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	





台灣野生藥用植物圖鑑

287 刺杜密	Bridelia balansae Tutcher	大戟科 Euphorbiaceae
別名		
分布	台灣平地至低海拔山區之闊葉林中，中國西南部、印度、緬甸、泰國等東南亞地區。	
形態	常綠小喬木。樹幹下部疏具棘刺(小枝退化)；多分枝，枝條細長而下垂。單葉，互生，紙質；倒卵形或披針狀長橢圓形；長 5~12 cm，寬 3~4.5 cm；基部楔形，先端銳尖；全緣；兩面光滑無毛，背面略白。花單性，雌雄同株，數朵簇生於葉腋，黃綠色。核果卵形，徑約 1 cm，熟時黑紫色。	
採集	全年採集根、枝、葉，乾品。	
功效	1、根具清熱、解毒、利尿、消腫之效。(邱年永等，2001) 2、枝、葉具清熱、解毒、調經之效。(邱年永等，2001)	
主治	1、根治跌打損傷、風濕關節痛等。(邱年永等，2001) 2、枝、葉治氣管炎、月經不調等。(邱年永等，2001)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	









289 飛揚草	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.	大戟科 Euphorbiaceae
別名	大飛揚草、大本乳仔草。	
分布	台灣平地至低、中海拔山區之空曠地，中國南部沿海地區、琉球、日本等。	
形態	一年生草本。全株淡紅色或帶紫色，被毛，具白色乳汁。莖直立或斜升，基部分枝。單葉，對生，形似展翅飛翔之鳥翼，故名之；長橢圓狀披針形；基部偏斜；表面疏被毛，常帶紫斑，背面疏被毛；細鋸齒緣。花單性，雌雄同生於花序中，聚繖花序再聚集成頭狀，無花被；雄花多數；雌花單生，位於聚繖花序之中央。蒴果細小，卵狀，具3稜。	
採集	夏季、秋季採集全草。	
功效	1、全草具清熱解毒、利濕止癢之效。(黃兆勝等，2005) 2、全草具通乳之效。(邱年永等，1986) 3、全草為刺激藥、祛痰藥、抗癰藥等。(甘偉松，1985)	
主治	1、全草治慢性支氣管炎、急性腸炎、細菌性痢疾等。(林余霖，2002) 2、全草治毒蛇咬傷、帶狀疱疹、淋濁等。(黃兆勝等，2005) 3、全草治皮膚炎、濕疹等。(羅獻瑞等，2003) 4、全草治哮喘、眼翳、瘡疾、疥癩、牙齒腫痛等。(甘偉松，1985) 5、全草治乳腺炎、肺癰、小兒疳積、婦女乳汁不通等。(邱年永等，1986)	
毒性	微毒。	
禁忌	不詳。	







290 小飛揚草	<i>Chamaesyce thymifolia</i> (L.) Millsp.	大戟科 Euphorbiaceae
別名	千根草、細本乳仔草。	
分布	台灣平地至低、中海拔山區之空曠乾旱地，泛世界熱帶地區。	
形態	一年生草本。全株含白色乳汁。莖多分枝，匍匐，紫紅色。單葉，對生；橢圓形至矩圓形；長 0.4~0.8cm，寬 0.2~0.4cm；基部截形，偏斜，先端鈍形或圓形，偶具小凸尖；細鋸齒緣；表面深綠色，背面淺綠色帶灰白色。花單性，杯狀花序，稀為聚繖花序，單生，腋生，近無花梗。蒴果卵狀 3 稜形，被毛；種子具 5~6 條縱溝紋。	
採集	夏季、秋季採集全草。	
功效	1、全草具清熱、利濕、收斂、止血、止癢、解毒、消腫之效。 (邱年永等，1986) 2、全草具清熱、利濕、消腫、解毒、收斂、止癢、止血之效。 (江蘇新醫學院，2005)	
主治	1、全草治急性菌痢、腸炎、痢疾、泄瀉、濕疹、過敏性皮膚炎、小兒爛頭瘍、乳癰、疔瘡、痔瘡等。(邱年永等，1986) 2、全草治瘧疾、痢疾、腸炎、皮膚炎、濕疹、痔瘡出血、乳癰、帶狀疱疹等。(江蘇新醫學院，2005)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	



