

291 裏白巴豆	<i>Croton cascarilloides</i> Raeusch.	大戟科 Euphorbiaceae
別名	葉下白。	
分布	台灣低海拔山區之潤葉樹林中，琉球、菲律賓、馬來西亞、印尼、婆羅洲等。	
形態	常綠小灌木。株高 60~120cm。全株被棕褐色鱗片及星狀毛。單葉，對生或輪生枝端；倒卵形或長卵形；長 4~8cm，寬 2.5~3.5cm；基部鈍形，先端鈍尖或漸尖；全緣或微波緣；背面銀白色。花單性，雌雄同株；花瓣黃白色或白色。蒴果球狀 3 稜形，徑約 1cm，被銹色鱗片物；種子 3。	
採集	全年採集全株。	
功效	1、根、全株具活血散瘀、舒筋活絡、鎮靜止痛、解毒消腫之效。(邱年永等，1995) 2、葉具解熱、止痢之效。(邱年永等，1995)	
主治	1、根治風濕痺痛、風濕關節疼痛、發熱病、瘡疾高熱不退、胃脘痛吐瀉、癰瘡腫毒等。(邱年永等，1995) 2、葉治吐瀉、疥癬等。(邱年永等，1995)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	





292	<i>Cronton tigilium</i> L.	大戟科 Euphorbiaceae
巴豆	落水金剛、雙眼龍、猛樹。	
別名	台灣引進栽培馴化野生於平地至低海拔山區之灌叢中，中國南部、馬來半島等。	
分布	常綠灌木或喬木。樹皮深灰色，平滑；小枝灰綠色，細縱裂；嫩枝綠色，疏被星狀毛，後即脫落光滑無毛。單葉，互生，紙質；卵形或長卵形；長 5-12cm，寬 2-6cm；基部圓形或潤楔形，邊緣具 2 腺體，先端漸尖；葉緣具淺鋸齒；基生 3 出脈，上部側脈 2-3 對；兩面光滑無毛或疏被星狀毛；葉柄長 2-6cm。花單性，雌雄同株，總狀花序；雄花在上部，花瓣 5，綠色；雌花在下部，無花瓣，子房密被星狀毛。蒴果倒卵形，具 3 稜；種子 3，長卵形，淡黃褐色或黑色。	
形態	全年採集根、葉；夏季、秋季採集果實，乾品。	
採集	1、根為墮胎藥；種子為猛瀉劑。(甘偉松，1985) 2、根具溫中散瘀、祛風消腫之效。(邱年永等，1986) 3、根具溫中散瘀、祛風活絡之效。(蕭步丹，2003) 4、葉具理跌打損傷之效；種子具瀉寒積、通關竅、逐痰、行水、殺蟲之效。(江蘇新醫學院，2005)	
功效	1、根治癰疽、疔瘡、風濕痹痛、跌打損傷、毒蛇咬傷等；種子治水腫、喉痹、惡瘡疥癬等。(邱年永等，1986) 2、葉治惡瘡、痰咳、瘡癬、疥癬等。(蕭步丹，2003) 3、葉治瘧疾、瘡癬、跌打損傷、毒蛇咬傷等。(江蘇新醫學院，2005) 4、種子治腹痛、便秘、毒蛇咬傷、小兒食積吐乳等。(甘偉松，1985)	
主治	有劇毒。	
毒性	胃腸膜炎、消化不良、口渴、脈快、舌黃者忌用。(吳進錫，1979)	
禁忌		





293 猩猩草	<i>Euphorbia cyathophora</i> Murray	大戟科 Euphorbiaceae
別名	墨西哥火草。	
分布	台灣引進栽培馴化野生於平地至低、中海拔山區之空曠地，熱帶地區等。	
形態	一年生草本。全株具白色乳汁。莖直立或斜升，具縱稜，光滑無毛或疏被毛；嫩莖綠色，中空。單葉，互生；葉形富變化，提琴形、卵狀披針形；全緣或波狀緣，或中裂成凹缺，或具鋸齒；葉柄常帶紅色；托葉腺體狀。莖先端葉狀苞之基部具一紅色斑塊；大戟花序，杯狀。蒴果卵圓形，具3稜。	
採集	全年採集全株。	
功效	1、全株為產婦藥。(甘偉松，1985) 2、全株具調經止血、接骨消腫等之效。(邱年永等，1983)	
主治	1、根、莖皮治瘡疾等。(甘偉松，1985) 2、全株治月經過多、跌打損傷等。(邱年永等，1983)	
毒性	具毒。	
禁忌	不詳。	





294 台灣大戟	<i>Euphorbia formosana</i> Hayata	大戟科 Euphorbiaceae
別名	大甲草、八卦草、五虎下山。	
分布	特產台灣海岸地區。	
形態	多年生草本。全株具白色乳汁。莖直立，基部多分枝。單葉，互生或輪生；線狀披針形；表面中肋黃色，明顯，側脈不明顯；背面粉白色；全緣；無托葉。花單性，雌雄同株，為同一總苞所包被，總苞壺形，具4腺體，並具黃色之葉狀苞；複繖形花序，頂生或腋生。蒴果細小，具3稜。	
採集	夏季、秋季採集全草。	
功效	1、根為皮膚消炎退癢藥。(甘偉松，1985) 2、全株具解毒消炎之效。(邱年永等，1983)	
主治	1、根、葉治毒蛇咬傷等。(甘偉松，1985) 2、根治狂犬咬傷、風濕症、跌打損傷等。(甘偉松，1985) 3、全株治皮膚疥癬等。(邱年永等，1983)	
毒性	具毒。	
禁忌	不詳。	





台灣野生藥用植物圖鑑

295 白苞猩猩草	<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	大戟科 Euphorbiaceae
別名	聖誕草。	
分布	台灣引進栽培馴化野生於平地至低海拔山區之空曠地，南美洲等。	
形態	一年生草本。全株具白色乳汁。莖直立或斜升，圓形，無稜，疏被刺毛。單葉，互生；卵形至披針形；全緣至鋸齒緣；葉柄被刺毛；托葉腺體狀。莖先端葉狀苞之基部具一黃白色斑塊；大戟花序，杯狀。蒴果卵圓形，具3稜。	
採集	全年採集全株，為猩猩草之代用品。	
功效	1、全株為產婦藥。(甘偉松，1985) 2、全株具調經止血、接骨消腫等之效。(邱年永等，1983)	
主治	1、根、莖皮治瘡疾等。(甘偉松，1985) 2、全株治月經過多、跌打損傷等。(邱年永等，1983)	
毒性	具毒。	
禁忌	不詳。	



