

行政院農業委員會林務局委託研究計畫系列 tfbc-10110510

森林野生藥用植物調查及圖鑑編著(4/4)  
成果報告



委託機關：行政院農業委員會林務局

執行機關：大葉大學

中華民國 102 年 06 月

# 森林野生藥用植物調查及圖鑑編著(4/4)計畫

何偉真

## 目錄

壹、前言

貳、目的

參、材料與方法

肆、結果

伍、結論

陸、參考文獻

## 【摘要】

本計劃查考一百二十種森林野生藥用植物，確認其學名、普通名，拍攝植物特徵照片，再查考其已知的毒性或禁忌、藥理和藥效，以及一般用法，編著成「森林野生藥用植物調查及圖鑑編著(4/4)」，並結合大葉大學藥用植物與保健學系開設之『植物分類學』課程，將部份藥用植物製作成臘葉標本保存之。校園內部分建置藥用植物園，本計畫所收集到之藥用植物並擬於大葉大學之藥圃中，將氣候適合之常見藥用植物種植在內，並加以標識學名及普通名，以方便學生學習和認識。

## 壹、前言

臺灣森林面積佔全國約 58%，孕育豐富物種，許多動、植物、菇類及礦物，經先祖長時間的經驗嚐試，累積許多藥用植物的知識。即使在不同的民族身上，亦常可發現，對相同的植物有相近似的功效描述，這些傳統的民族醫藥，被用來強身或治病，亦常常有優於西藥的效果。此等珍貴的智慧財產，目前正逐漸受到全世界許多先進國家的重視並加以研究探討，冀望發展出保障人類健康的新型藥品或保健藥物和食品。但台灣因工商社會的發達，及西醫崛起，許多可貴的藥用植物之認識及使用方法，均在式微中，致使中草藥醫病之技術逐漸被忽略。反觀先進國家如德國、美國、澳州等國正加緊致力於藥用植物的研究，不但推出許多新天然藥物，亦出版了許多相關的書籍、圖譜等，對藥用植物的重視和推廣可謂不遺餘力。中華民族一直被認為是使用中草藥的先趨者，但台灣地區之森林中的藥用植物，常因地區不同，而有許多「同名異物」及「同物異名」的困擾，使真正的知識內容失真或失傳，此對後世子孫來說是一大悲劇。因此，如何整理出一套正確的資訊供後人參採及進一步研究，甚為重要。

## 貳、目的

本案擬由有記錄的藥用植物書籍資料中，逐筆整理出臺灣森林中野生的藥用植物，拍攝其植物形態和紀錄其分布情形，並比對大陸及台灣出版之相關圖書及藥理資料，加以查考及改正誤謬，以圖文併列方式分別整理詳述藥用植物形態、分布、毒性、禁忌、藥理、用量、功效等，每種植物之重要辨識特徵，除了以紅色標誌外，亦予以拍照特寫之，以利後人查閱及進一步研發，並可避免先人之珍貴智慧財產流失。

## 參、材料與方法

### 材料

臺灣地區可見之野生藥用植物，作為目標材料。

### 方法及步驟

1. 整理臺灣地區原有記錄資料，並比對大陸地區資料，加以查考及改正誤謬。
2. 以自行拍攝圖片及撰文併列方式，分別整理詳述森林野生藥用植物之形態、分布、毒性、禁忌、藥理、用量、功效及禁忌等。
3. 將森林野生藥用植物之記錄編輯成冊。
  - (a)訪問草藥師、中醫師常用藥用植物種類。
  - (b)查考其名稱和實物，釐清「同物異名」或「同名異物」之困擾。並依據 Flora of Taiwan 科名之排列順序及學名之取用。
  - (c)在森林中尋找各藥用植物，照相全株或花、果實等部位，如屬稀少種類並作成標本。
  - (d)整理各藥用植物之學名、普通名、植物形態及分布、藥理、藥效、藥量和毒性、禁忌等，編著成為「森林野生藥用植物調查及圖鑑編著(4/4)」

## 肆、結果

- 一、本計畫發現台灣玄參科 Scrophulariaceae 之新紀錄種：腹水草 *Veronicastrum axillare* (Sieb. et Zucc.) Yamaz. (詳如第 68 頁 561 腹水草)。
- 二、本計畫收集森林野生藥用植物，茲整理如下：120 種名錄、60 種表格含照片。

### 一百二十二、 龍膽科 Gentianaceae

461. 玉山肺形草 *Tripterospermum lanceolatum* (Hayata) H. Hara ex Satake

### 一百二十三、 夾竹桃科 Apocynaceae

462. 蘭嶼念珠藤 *Alyxia sibuyanensis* Elmer  
463. 台灣念珠藤 *Alyxia taiwanensis* S. Y. Lu et Y. P. Yang  
464. 蘿芙木 *Rauvolfia verticillata* (Lour.) Baill.  
465. 南洋馬蹄花 *Tabernaemontana pandacaqui* Poir.  
466. 蘭嶼馬蹄花 *Tabernaemontana subglobosa* Merr.  
467. 絡石 *Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lemaire  
468. 蘭嶼絡石 *Trachelospermum lanyuense* C. E. Chang

### 一百二十四、 蘿藦科 Asclepiadaceae

469. 馬利筋 *Asclepias curassavica* L.  
470. 小葉眼樹蓮 *Dischidia formosana* Maxim.

- 471.武靴藤 *Gymnema sylvestre* (Retz.) Schultes  
 472.台灣牛彌菜 *Marsdenia formosana* Masam.  
 473.絨毛芙蓉蘭 *Marsdenia tinctoria* R. Br.

一百二十五、 茜草科 Rubiaceae

- 474.伏牛花 *Damnacanthus indicus* Gaertn.  
 475.刺果豬殃殃 *Galium echinocarpum* Hayata  
 476.山黃梔 *Gardenia jasminoides* Ellis  
 477.苞花蔓 *Geophila herbacea* (Jacq.) Kuntze  
 478.繖花龍吐珠 *Hedyotis corymbosa* (L.) Lam.  
 479.白花蛇舌草 *Hedyotis diffusa* Willd.  
 480.南投涼喉茶 *Hedyotis hedyotidea* (DC.) Merr.  
 481.小葉傘花樹 *Morinda parvifolia* Bartl.  
 482.傘花樹 *Morinda umbellata* L.  
 483.玉葉金花 *Mussaenda parviflora* Miq.  
 484.毛雞屎藤 *Paederia cavaleriei* H. Le'vl.  
 485.雞屎藤 *Paederia foetida* L.  
 486.九節木 *Psychotria rubra* (Lour.) Poir.  
 487.拎壁龍 *Psychotria serpens* L.  
 488.茜草 *Rubia akane* Nakai  
 489.金劍草 *Rubia lanceolata* Hayata  
 490.六月雪 *Serissa serissoides* (DC.) Druce  
 491.台灣鉤藤 *Uncaria hirsuta* Havil.  
 492.恒春鉤藤 *Uncaria lanosa* Wall. var. *appendiculata* Ridsdale

一百二十六、 旋花科 Convolvulaceae

- 493.平原菟絲子 *Cuscuta campestris* Yunck.  
 494.台灣菟絲子 *Cuscuta japonica* Choisy var. *formosana* (Hayata) Yunck.  
 495.馬蹄金 *Dichondra micrantha* Urb.  
 496.亨利氏伊立基藤 *Erycibe henryi* Prain  
 497.土丁桂 *Evolvulus alsinoides* (L.) L.  
 498.馬鞍藤 *Ipomoea pes-caprae* (L.) R. Br. subsp. *brasiliensis* (L.) Oostst.

一百二十七、 紫草科 Boraginaceae

- 499.細纓子草 *Bothriospermum zeylanicum* (J. Jacq.) Druce  
 500.小葉厚殼樹 *Carmona retusa* (Vahl) Masam.  
 501.破布子 *Cordia dichotoma* G. Forst.  
 502.琉璃草 *Cynoglossum furcatum* Wall.

503.白水木 *Tournefortia argentea* L. f.

504.冷飯藤 *Tournefortia sarmentosa* Lam.

一百二十八、 馬鞭草科 Verbenaceae

505.台灣紫珠 *Callicarpa formosana* Rolfe

506.朝鮮紫珠 *Callicarpa japonica* Thunb. var. *luxurians* Rehder

507.鬼紫珠 *Callicarpa kochiana* Makino

508.巒大紫珠 *Callicarpa randaiensis* Hayata

509.重瓣臭茉莉 *Clerodendrum chinense* (Osbeck) Mabb. var. *chinense*  
(Moldenke) S. L. Chen

510.臭茉莉 *Clerodendrum chinense* (Osbeck) Mabb. var. *simplex* (Moldenke)  
S. L. Chen

511.大青 *Clerodendrum cyrtophyllum* Turcz.

512.苦林盤 *Clerodendrum inerme* (L.) Gaertn.

513.龍船花 *Clerodendrum kaempferi* (Jacq.) Sieb. ex Steud.

514.海州常山 *Clerodendrum trichotomum* Thunb.

515.石莧 *Phyla nodiflora* (L.) Greene

516.長穗木 *Stachytarpheta jamaicensis* (L.) Vahl

517.黃荊 *Vitex negundo* L.

518.薄姜木 *Vitex quinata* (Lour.) F. N. Williams

519.單葉蔓荊 *Vitex rotundifolia* L. f.

一百二十九、 唇形科 Labiatae

520.網果筋骨草 *Ajuga dictyocarpa* Hayata

521.日本筋骨草 *Ajuga nipponensis* Makino

522.矮筋骨草 *Ajuga pygmaea* A. Gray

523.台灣筋骨草 *Ajuga taiwanensis* Nakai ex Murata

524.光風輪 *Clinopodium gracile* (Benth.) Kuntze

525.疏花風輪菜 *Clinopodium laxiflorum* (Hayata) Mori

526.到手香 *Coleus amboinicus* Lour.

527.金錢薄荷 *Glechoma hederacea* L. var. *grandis* (A. Gray) Kudo

528.頭花四方骨 *Hyptis rhomboides* Mart. et Gal.

529.香苦草 *Hyptis suaveolens* (L.) Poir.

530.益母草 *Leonurus japonicus* Houtt.

531.白花草 *Leucas chinensis* (Retz.) R. Br.

532.蜜蜂花 *Melissa axillaris* Bakh. f.

533.貓鬚草 *Orthosiphon aristatus* (Blume) Miq.

534.夏枯草 *Prunella vulgaris* L. subsp. *asiatica* (Nakai) H. Hara

535.紅花鼠尾草 *Salvia coccinea* Juss. ex Murray

536.半枝蓮 *Scutellaria barbata* D. Don

537.耳挖草 *Scutellaria indica* L.

一百三十、茄科 Solanaceae

538.大花曼陀羅 *Brugmansia suaveolens* (Willid.) Bercht. et C. Presl

539.曼陀羅 *Datura metel* L.

540.雙花龍葵 *Lycianthes biflora* (Lour.) Bitter

541.枸杞 *Lycium chinense* Mill.

542.苦蕒 *Physalis angulata* L.

543.秘魯苦蕒 *Physalis peruviana* L.

544.刺茄 *Solanum capsicoides* All.

545.瑪瑙珠 *Solanum diphyllum* L.

546.毛玉珊瑚 *Solanum pseudocapsicum* L.

547.萬桃花 *Solanum torvum* Sw.

548.黃水茄 *Solanum undatum* Lam.

549.印度茄 *Solanum violaceum* Ortega

550.龍珠 *Tubocapsicum anomalum* (Franch. et Sav.) Makino

一百三十一、玄參科 Scrophulariaceae

551.過長沙 *Bacopa monnieri* (L.) Wettst.

552.毛地黃 *Digitalis purpurea* L.

553.異葉紅珠 *Hemiphragma heterophyllum* Wall.

554.定經草 *Lindernia anagallis* (Burm. f.) Pennell

555.泥花草 *Lindernia antipoda* (L.) Alston

556.藍豬耳 *Lindernia crustacea* (L.) F. Muell.

557.通泉草 *Mazus pumilus* (Burm. f.) Steenis

558.台灣泡桐 *Paulownia taiwaniana* T. W. Hu et H. J. Chang

559.野甘草 *Scoparia dulcis* L.

560.釘地蜈蚣 *Torenia concolor* Lindl.

561.腹水草 *Veronicastrum axillare* (Sieb. et Zucc.) Yamaz.

一百三十二、紫葳科 Bignoniaceae

562.山菜豆 *Radermachia sinica* (Hance) Hemsl.

一百三十三、爵床科 Acanthaceae

563.尼氏擬馬偕花 *Asystasiella neesiana* (Nees) Lindau

564.華九頭獅子草 *Dicliptera chinensis* (L.) Juss.

- 565.六角英 *Hypoestes purpurea* R. Br.  
 566.爵床 *Justicia procumbens* L.  
 567.九頭獅子草 *Peristrophe japonica* (Thunb.) Bremek.  
 568.長花九頭獅子草 *Peristrophe roxburghiana* (Schult.) Bremek.  
 569.馬藍 *Strobilanthes cusia* (Ness) Kuntze  
 570.曲莖馬藍 *Strobilanthes flexicaulis* Hayata  
 571.台灣馬藍 *Strobilanthes formosanus* Moore

一百三十四、 苦苣苔科 Gesneriaceae

- 572.長果藤 *Aeschynanthus acuminatus* Wall. ex A. DC.  
 573.角桐草 *Hemiboea bicornuta* (Hayata) Ohwi  
 574.石吊蘭 *Lysionotus pauciflorus* Maxim.  
 575.尖舌草 *Rhynchoglossum obliquum* Blume var. *hologlossum* (Hayata) W. T.  
 Wang  
 576.同蕊草 *Rhynchotechum discolor* (Maxim.) B. L. Burtt  
 577.俄氏草 *Titanotrichum oldhamii* (Hemsl.) Soler.

一百三十五、 列當科 Orobanchaceae

- 578.野菰 *Aeginetia indica* L.  
 579.列當 *Orobanche coerulescens* Stephan

一百三十六、 苦檻藍科 Myoporaceae

- 580.苦檻藍 *Myoporum bontioides* (Sieb. et Zucc.) A.Gray



<b>461</b> 玉山肺形草	<i>Tripterospermum lanceolatum</i> (Hayata) H. Hara <i>ex Satake</i>	龍膽科 Gentianaceae
別名	披針葉肺形草。	
分布	特產台灣中、高海拔之森林林緣。	
形態	多年生纏繞(左旋)草質蔓藤。地下根莖短。根生葉通常 2 對，莖生葉對生，披針形或狹披針形，偶狹卵形；基部圓形或近心形，先端漸尖；基生 3 出脈；全緣；葉柄長 0.5~1.7cm。花兩性，單朵或 2~3 朵之聚繖花序；花冠筒狀，粉紅色、藍色或近白色，外具綠色條紋，長 3~5cm。漿果紡錘形至橢圓形。	
採集	夏季、秋季採集全草。	
功效	1、全草具滌火邪、健胃潤腸之效。(吳進錫，1981) 2、全草具清熱解毒、祛痰止咳之效。(羅獻瑞等，2003)	
主治	1、根治肝膽實火濕熱、酒疸、濕瘡等。(吳進錫，1981) 2、葉治腫毒等。(吳進錫，1981) 3、全草治支氣管炎、肺膿瘍、肺結核、疔瘡癰腫、小兒高熱等。(羅獻瑞等，2003)	
毒性	不詳。	
禁忌	胃虛寒、溺多不禁者慎用。(吳進錫，1981)	

<b>462</b> 蘭嶼念珠藤	<i>Alyxia sibuyanensis</i> Elmer	夾竹桃科 Apocynaceae
別名	蘭嶼鏈珠藤。	
分布	特產台灣綠島和蘭嶼之林緣或灌叢中。	
形態	常綠纏繞(右旋)木質蔓藤。全株具乳汁。莖枝粗硬，綠色，光滑無毛。單葉，輪生，革質；倒卵形或倒披針形；長 5~10cm，寬 2~4cm；基部銳尖或漸尖，先端鈍形或圓形，偶微凹；全緣；側脈多數，筆直而平行；表面綠色，背面黃綠色，兩面光滑無毛；葉柄長 1~1.5cm，光滑無毛。花兩性，聚繖花序，頂生；花萼 5 裂，裂片三角形；花冠高杯形，白色或淡黃白色，5 裂，裂片卵形，左旋重疊；雄蕊 5，著生於花冠筒上；子房卵球形；花柱長；柱頭 2 裂。核果橢圓形，常 2~3 節連成念珠狀，每節種子 1。	
採集	全年採集全株，乾品。	
功效	全株具祛風活血、通經活絡之效。(蕭步丹，2003)	
主治	全株治風濕性關節炎、腰酸背痛、跌打損傷、皮膚疹疥等。(蕭步丹，2003)	

毒 性	不詳。
禁 忌	孕婦及體質陰虛者忌用。(林國華，1987)

<b>463</b> 台灣念珠藤	<i>Alyxia taiwanensis</i> S. Y. Lu et Y. P. Yang	夾竹桃科 Apocynaceae
別 名	台灣鏈珠藤。	
分 布	特產台灣中海拔山區之森林中或林緣。	
形 態	常綠纏繞（右旋）木質蔓藤。莖枝纖細柔軟，具乳汁。單葉，輪生，偶對生，革質；橢圓狀披針形；長 2~2.5cm，寬 1~1.5cm；先端漸尖，基部銳形；全緣；主脈於葉面明顯，於葉背不明顯，側脈於兩面均不明顯；葉柄短。花兩性，聚繖花序，頂生或腋生；花冠高杯形，白色或淡粉紅色，被毛，花 5 數。核果卵形，常 2~3 節連成念珠狀，每節種子 1。	
採 集	全年採集全株，乾品。	
功 效	全株具祛風活血、通經活絡之效。(蕭步丹，2003)	
主 治	全株治風濕性關節炎、腰酸背痛、跌打損傷、皮膚疹疥等。(蕭步丹，2003)	
毒 性	不詳。	
禁 忌	孕婦及體質陰虛者忌用。(林國華，1987)	

<b>464</b> 蘿 芙 木	<i>Rauvolfia verticillata</i> (Lour.) Baill.	夾竹桃科 Apocynaceae
別 名	白花蓮。	
分 布	台灣低海拔地區，中國南部、印度等。	
形 態	常綠灌木。全株具乳汁。小枝疏生皮孔。單葉，輪生，罕對生；長橢圓形；兩端漸尖；兩面光滑無毛；全緣或微波緣。花兩性，聚繖花序，頂生或腋生；花萼 5 深裂，綠色；花冠高杯形，白色，長 1~1.5cm，上部 5 裂；柱頭棒狀，上部具一環狀薄膜，可與台灣蘿芙木的花冠長 0.75cm、柱頭球形、基部無薄膜等區別之。核果卵形或橢圓形，熟時紫黑色。	
採 集	秋季、冬季採集根；夏季、秋季採集葉。	
功 效	1、根具清涼解毒、消腫退癩之效。(甘偉松，1981) 2、根具鎮靜、降壓、活血止痛之效。(林國華，1987) 3、根、莖具消炎、利尿之效。(邱年永等，1983)	
主 治	1、根治皮膚癢、下消、白帶、風濕、高血壓等。(甘偉松，1981) 2、根治瘡疾、筋肉疼痛等。(高木村，1986)	

	3、根治毒蛇咬傷、跌打損傷等。(林國華，1987) 4、根治腰痛、頭痛、咽喉疼痛、膽囊炎等。(邱年永等，1983) 5、葉治創傷出血。(邱年永等，1983)
毒 性	無。
禁 忌	孕婦忌用。(林國華，1987)

<b>465</b> 南洋馬蹄花	<i>Tabernaemontana pandacahui</i> Poir.	夾竹桃科 Apocynaceae
別 名	山馬茶、狗牙花、真山馬茶。	
分 布	台灣引進栽植馴化野生於南部低海拔地區，原產麥克羅尼西亞至菲律賓等。	
形 態	常綠灌木。全株光滑無毛，具白色乳汁。單葉，對生，偶輪生；長橢圓形；先端銳尖或漸尖；表面深綠色，背面淡綠色；全緣或波狀緣。花兩性，繖房花序，頂生或腋生；花萼5裂，綠色；花冠高杯形，白色，具芳香，單瓣或重瓣，花瓣邊緣皺曲。蓇葖果卵狀披針形，具4稜，先端喙尖，熟時橙紅色。	
採 集	全年採集根、幹、葉、花。	
功 效	1、根、幹具抗癌作用。(甘偉松，1981) 2、根、幹具清熱解毒之效。(林國華，1997) 3、根、幹具利尿、消腫、止痛之效。(高木村，1986) 4、根、幹具降血壓之效。(邱年永等，1995)	
主 治	1、根、幹治甲狀腺腫、頭痛、疥瘡等。(邱年永等，1995) 2、根、幹治目赤腫痛、咽喉腫痛、乳癰等。(高木村，1986) 3、根、幹治高血壓、骨折等。(林國華，1997) 4、葉治瘡癤、乳腺炎、瘋狗咬傷等。(邱年永等，1995)	
毒 性	無。	
禁 忌	不詳。	

<b>466</b> 蘭嶼馬蹄花	<i>Tabernaemontana subglobosa</i> Merr.	夾竹桃科 Apocynaceae
別 名	蘭嶼山馬茶、革葉山馬茶。	
分 布	台灣蘭嶼，菲律賓等。	
形 態	常綠灌木。全株光滑無毛，具白色乳汁。單葉，對生，革質；橢圓形至長橢圓形；先端鈍或近圓形；表面深綠色，背面淡綠色；全緣。花兩性，聚繖狀繖房花序，頂生或腋生；花萼5裂，綠色；花冠高杯形，灰黃色，具芳香，單瓣，花瓣全緣。蓇葖	

	果歪卵形，具 2 稜，先端圓鈍，熟時橙色。
採集	全年採集根、幹、葉。
功效	全株具清熱、解毒、消腫、降血壓、殺蟲之效。(邱年永等，1985)
主治	1、根、幹治乳癰、風濕症、肌肉疼痛、高血壓等。(邱年永等，1985) 2、葉治癰瘡腫毒等。(高木村，1996)
毒性	微毒。
禁忌	不詳。

467	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lemaire	夾竹桃科 Apocynaceae
絡石別名	台灣白花藤、萬字茉莉。	
分布	台灣低海拔山區之林緣或灌叢中，中國、海南島、香港、越南、韓國、日本等。	
形態	常綠攀緣木質蔓藤。莖紅褐色，多分枝，具不定根，嫩枝密被細毛，具皮孔，具乳汁。單葉，對生，厚紙質，嫩葉被灰褐色絨毛；橢圓形至披針形，變化頗大；長 3~10cm，寬 1~4cm；基部鈍形或楔形，先端鈍形或短凸尖；全緣；表面深綠色，背面淡綠色，兩面被毛。花兩性，聚繖花序，頂生，被毛，花 5 數；花冠高杯形，白色，具香味；雄蕊深含於花冠筒內，花冠口被毛。蓇葖果 2，細長圓柱形，長約 15cm，內含多數種子；種子頂端具一束白色絨毛。	
採集	秋季採集全株、未熟果，乾品。	
功效	1、全株具宣風熱、涼血、通筋絡之效，為強壯藥、通經藥、鎮痛藥等。(甘偉松，1981) 2、全株具祛風、通絡、止血、消瘀之效。(江蘇新醫學院，2005) 3、全株具祛風、通絡、消瘀涼血、止血、止痛之效。(邱年永等，1986)	
主治	1、全株治喉痛、關節疼痛、癰腫、腫毒等。(甘偉松，1981) 2、全株治關節炎、肺結核、喉痹咽塞、喘息不通、吐血、外傷出血等。(江蘇新醫學院，2005) 3、全株治小便白濁、癰疽疼痛、跌打脫臼等。(邱年永等，1986) 4、未熟果治筋骨痛等。(邱年永等，1986)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	

468 蘭嶼絡石	<i>Trachelospermum lanyuense</i> C. E. Chang	夾竹桃科 Apocynaceae
別名		
分布	特產台灣綠島和蘭嶼之林緣或灌叢中。	
形態	常綠攀緣木質蔓藤。全株具乳汁。莖多分枝，具不定根，莖和枝光滑無毛，具皮孔。單葉，對生，厚紙質；橢圓形或倒卵形；長 3~10cm，寬 1~4cm；基部楔形，先端銳尖或圓凸尖；全緣；表面深綠色，背面淡綠色；兩面均被毛。花兩性，聚繖花序，頂生；被毛，花 5 數；花冠高杯形，白色，具香味，5 裂，花冠口部被毛；雄蕊 5；花藥先端到達花冠口。蓇葖果 2，細長圓柱形，長 15~25cm，內含多數種子；種子頂端具一束白色絨毛。	
採集	秋季採集全株、未熟果，乾品。	
功效	1、全株具宣風熱、涼血、通筋絡之效，為強壯藥、通經藥、鎮痛藥等。(甘偉松，1981) 2、全株具祛風、通絡、止血、消瘀之效。(江蘇新醫學院，2005) 3、全株具祛風、通絡、消瘀涼血、止血、止痛之效。(邱年永等，1986)	
主治	1、全株治喉痛、關節疼痛、癰腫、腫毒等。(甘偉松，1981) 2、全株治關節炎、肺結核、喉痹咽塞、喘息不通、吐血、外傷出血等。(江蘇新醫學院，2005) 3、全株治小便白濁、癰疽疼痛、跌打脫臼等。(邱年永等，1986) 4、未熟果治筋骨痛等。(邱年永等，1986)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	

469 馬利筋	<i>Asclepias curassavica</i> L.	蘿藦科 Asclepiadaceae
別名	尖尾鳳、蓮生桂子花。	
分布	台灣引進栽植馴化野生於低海拔地區，原產熱帶美洲等。	
形態	多年生草本。全株光滑，具白色乳汁。莖基部木質化，分枝少，節明顯。單葉，對生；長披針形；先端漸尖；側脈 12~18 對；全緣。花兩性，聚繖狀繖形花序，具 10~30 朵花；花冠紅色，5 裂，副花冠黃色，5 裂。蓇葖果長橢圓形，先端漸尖；種子具冠毛。	
採集	全年採集全草。	
功效	1、全草具消炎止痛、活血、止血、強心之效。(林國華，1997)	

	2、全草具祛痰、消腫、抗癌之效。(吳進錫，1980) 3、根具催吐，瀉下之效。(張憲昌，1997) 4、葉具消炎之效。(吳進錫，1980)
主治	1、全草治骨折、刀傷、濕疹、頑癬、乳腺炎、癰癤、痛經等。 (林國華，1997) 2、全草治扁桃腺炎、肺炎、支氣管炎等。(高木村，1996) 3、全草治帶狀疱疹、皮膚炎、癌症腫瘤等。(吳進錫，1980) 4、全草治尿道炎、月經不調等。(張憲昌，1997)
毒性	有毒。
禁忌	慎用。(林國華，1997)

<b>470</b> 小葉眼樹蓮	<i>Dischidia formosana</i> Maxim.	蘿藦科 Asclepiadaceae
別名	風不動、蝙蝠藤、瓜子金。	
分布	台灣低、中海拔山區，中國南部、印度、越南、馬來西亞等。	
形態	多年生攀緣草質蔓藤。全株光滑無毛，具乳汁。莖肉質，綠色，纖細，具節，節上具不定根，藉以攀緣。單葉，對生，肉質；近圓形或倒卵形；葉脈不明顯；全緣。花兩性，聚繖花序，腋生，具多數小花；花冠鐘形，白色或黃白色，副花冠由 5 枚絲狀裂片組成。蓇葖果細柱狀；種子先端具冠毛。	
採集	夏季、秋季採集全草。	
功效	1、全草具消炎、解熱、利尿、止瀉之效。(甘偉松，1981) 2、全草具祛痰定神、消腫止痛之效。(黃兆勝等，2005) 3、全草具清肺化痰、涼血解毒之效。(林國華，1987) 4、全草具養陰生津、催乳之效。(邱年永等，1995)	
主治	1、全草治淋病、痢疾、關節炎、帶狀疱疹等。(甘偉松，1981) 2、全草治咳嗽痰多、心神不安、毒蛇咬傷、咽喉腫痛等。 (黃兆勝等，2005) 3、全草治肺燥咳血、小兒疳積、跌打損傷、瘡癤腫毒等。 (林國華，1987) 4、全草治陽痿、小兒膿疱瘡、乳癰等。(邱年永等，1995)	
毒性	無。	
禁忌	不詳。	

<b>471</b> 武靴藤	<i>Gymnema sylvestre</i> (Retz.) Schultes	蘿藦科 Asclepiadaceae
別名	羊角藤、匙羹藤。	
分布	台灣低海拔地區，中國南部、熱帶非洲、亞洲、澳洲等。	
形態	常綠纏繞（右旋）木質蔓藤。全株具乳汁。莖、花序被短柔毛。莖具皮孔。單葉，對生；卵形、倒卵形或長橢圓形；先端鈍或短凸尖；兩面光滑或背面脈上被毛；全緣；具短柄，被毛，先端具腺體。花兩性，聚繖狀繖形花序，腋生，花小，淡綠色；花冠鐘狀，5裂，裂片卵圓形，副花冠鱗片狀，與花冠裂片互生（著生於花冠裂缺處）。蓇葖果羊角狀，基部膨大，圓形，先端漸尖；種子具冠毛。	
採集	全年採集根、嫩枝葉。	
功效	1、根、嫩枝葉具消腫解毒、清熱涼血之效。(甘偉松，1981) 2、嫩枝葉具止痛、生肌之效。(邱年永等，1983)	
主治	1、根、嫩枝葉治癰瘡腫毒等。(甘偉松，1981) 2、根、嫩枝葉治乳腺炎、風濕性關節疼痛、毒蛇咬傷等。(林國華，1987) 3、根治跌打損傷等；嫩枝葉治槍彈傷等。(邱年永等，1983)	
毒性	無。	
禁忌	孕婦慎用。(邱年永等，1983)	

<b>472</b> 台灣牛彌菜	<i>Marsdenia formosana</i> Masam.	蘿藦科 Asclepiadaceae
別名	牛奶藤、奶漿菜。	
分布	台灣低、中海拔山區，琉球等。	
形態	常綠纏繞（右旋）木質蔓藤。全株光滑無毛，具白色乳汁。莖綠色。單葉，對生，厚肉質；卵形或卵狀闊橢圓形；基部圓形或鈍形；葉脈不明顯；全緣。花兩性，繖形花序，腋生；花冠鐘形，淡黃綠色，副花冠與雄蕊合生；柱頭長喙狀伸長。蓇葖果紡錘形；種子具冠毛。	
採集	全年採集莖。	
功效	莖具舒筋、和血、解毒、消腫、通經、催乳之效。(邱年永等，1998)	
主治	莖治肝脾腫大，風濕性關節疼痛、跌打損傷、乳汁不通等。(邱年永等，1998)	
毒性	不詳。	
禁忌	誤食根部，令人髮落。(邱年永等，1998)	

<b>473</b> 絨毛芙蓉蘭	<i>Marsdenia tinctoria</i> R. Br.	蘿藦科 Asclepiadaceae
別名	藍葉藤。	
分布	台灣低海拔山區之林緣或灌叢中，亞洲和非洲之熱帶地區。	
形態	常綠纏繞(右旋)木質蔓藤。全株具白色乳汁。嫩枝葉密被絨毛。單葉，對生，紙質；披針形或卵形，乾燥後為藍色；長 6~9cm，寬 2.5cm~4.5cm；基部心形或圓形，先端短漸尖至短凸尖，具 2~5 腺體；全緣，略反捲；表面深綠色或帶藍色，背面淡灰綠色，兩面被絨毛；葉柄 1~4cm，被絨毛。花兩性，繖形花序，腋生，花多數；花冠短鐘形，黃白色，喉部被毛，副花冠 5，直立。蓇葖果長三角圓錐形，密被絨毛，長 4~6cm，熟時橙黃色，內具多數種子；種子具白色長冠毛。	
採集	全年採集根、粗莖；秋季採集果實，乾品。	
功效	1、根、粗莖具祛風利濕、補脾益氣、溫經鎮痛之效。(邱年永等，1998) 2、全株具滋補之效。(羅獻瑞等，2001)	
主治	1、根、粗莖治脾臟虛弱、肝腫大、乳汁不足、腰痛、風濕筋骨疼痛、跌打損傷等。(邱年永等，1998) 2、果實治心胃氣痛等。(羅獻瑞等，2001)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	

<b>474</b> 伏牛花	<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn.	茜草科 Rubiaceae
別名	虎刺。	
分布	台灣低、中海拔山區之森林中，亞洲東部等。	
形態	常綠灌木。全株幼嫩部份被微毛，株高 40~100cm。根粗大分枝或縮呈念珠狀，根皮淡黃色。單葉，對生，厚紙質；卵形、潤卵形或心形；長 1.5~3cm，寬 0.5~1.5cm；基部圓形或淺心形，先端銳尖具 1 短芒尖；全緣；近無柄，葉柄間兩面各具 1 長刺。花兩性，1~2 朵著生於葉腋，白色；花萼鐘形，4 裂，被毛；花冠高杯狀，先端 4 裂，花冠口被毛；雄蕊 4，著生於花冠筒基部；花藥先端幾達花冠口；子房下位，4 室；花柱長；柱頭 4 裂。核果球形，徑 0.4~0.7cm，光滑無毛，具 4 稜和溝槽，熟時深紅色。	
採集	全年採集根、全草，夏季採集花，乾品。	
功效	1、全株具祛風除濕、活絡、止痛之效。(羅獻瑞等，2000) 2、根具止咳、補血氣之效；花具祛風除濕、疏筋止痛之效。(江	



	蘇新醫學院，2005) 3、根和全株具祛風利濕、活血理氣、消腫止痛之效。(邱年永等，1993)
主治	1、全株治風濕痹痛、腰痛、跌打損傷等。(羅獻瑞等，2000) 2、根治痛風、風濕關節痛、肌肉酸痛、痰飲咳嗽；花治久風濕痹、四肢拘攣、骨肉疼痛、五痔下血、痛風等。(江蘇新醫學院，2005) 3、根治痛風、風濕痹痛、急性肝炎、黃疸、水腫等。(邱年永等，1993)
毒性	不詳。
禁忌	不詳。

475 刺果豬殃殃	<i>Galium echinocarpum</i> Hayata	茜草科 Rubiaceae
別名		
分布	特產台灣中部和北部中、高海拔山區之森林中。	
形態	一年生草本。株高 10~25cm。莖匍匐狀，多分枝，纖細，具 4 稜，不具倒鉤刺亦不被毛。單葉，4~6 枚輪生，膜質；倒披針形至長橢圓形；長 1~2cm，寬 0.2~0.4cm；葉緣具疏鋸齒；主脈 1；表面疏被毛，背面僅中肋疏被毛。花兩性，聚繖花序，頂生或腋生；花冠輪狀，4 裂；雄蕊 4，與花瓣裂片互生(著生於裂間角)；子房下位，2 室；花柱 2 裂；雌蕊各部均被刺毛。蒴果孿生，外被鉤毛。	
採集	秋季採集全草，乾品。	
功效	全草具清熱利濕、散瘀消腫、活血調經、解毒抗癌之效。(邱年永，1993)	
主治	全草治五淋、急性盲腸炎、婦女經閉、尿血、痢疾、腸癰、瘡癤、尿血、跌打損傷等。(邱年永，1993)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	

476 山黃梔	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	茜草科 Rubiaceae
別名	梔子。	
分布	台灣低、中海拔山區，中國南部、印度至日本等。	
形態	常綠灌木或喬木。嫩枝被細毛。單葉，對生或偶輪生；橢圓形至長橢圓形；表面具光澤，側脈明顯；全緣；托葉腋生，基部連生成鞘狀。花單朵，頂生或腋生，大型，白色，具香氣；花萼倒圓錐狀，綠色；花冠高杯狀，裂片 5~7(通常 6)；雄蕊與花冠裂片同數，著生於花管喉部；柱頭棒狀。果實卵形、倒卵形或卵狀橢圓形，具縱稜 5~9，熟時橘紅色，先端具宿存萼裂片。	
採集	全年採集根、葉；秋季、冬季採集果實。	
功效	1、果實為消炎解熱藥。(甘偉松，1981) 2、果實具利膽、鎮靜、降壓、抗菌之效；根具清熱、涼血、解毒之效。(邱年永等，1986) 3、果實具消炎、利尿之效。(田中孝治，2003) 4、果實具瀉火除煩、清熱利濕、涼血散瘀之效。(羅獻瑞等，2003) 5、葉具消腫、去瘀、止血之效。(蕭步丹，2003)	
主治	1、果實治黃疸、衄血、吐血、尿血、瘀血腫痛等。(羅獻瑞等，2003) 2、果實治淋病、牙痛、小便不利等。(吳進錫，1981) 3、果實治胃炎、食道炎、血尿淋痛、跌打損傷等。(甘偉松，1981) 4、果實治眼結膜炎，口舌生瘡等。(林國華，1987) 5、葉治瘡瘍腫毒、跌打損傷等。(蕭步丹，2003)	
毒性	無。	
禁忌	不詳。	

477 苞花蔓	<i>Geophila herbacea</i> (Jacq.) Kuntze	茜草科 Rubiaceae
別名	愛地草。	
分布	台灣低、中海拔山區，中國南部及西南部、熱帶至亞熱帶地區等。	
形態	一年生匍匐草本。多分枝，莖纖細，疏被毛，具節，節表面長葉，背面生根。單葉，對生；圓形、腎形或潤卵形；基部心形，先端鈍或圓形；表面光滑無毛，背面疏被毛；托葉潤卵形；具長柄。花兩性；單朵或繖房花序，頂生；花冠長漏斗形，白色，4~5 裂。核果球形，熟時紅色。	

採集	全年採集全草。
功效	全草具解毒、消腫、排膿之效。(邱年永等，1998)
主治	全草治胃澆痛、腎炎、無名腫毒、疔瘡、跌打損傷、毒蛇咬傷等。(邱年永，1998)
毒性	無。
禁忌	不詳。

<b>478</b> 繖花龍吐珠	<i>Hedyotis corymbosa</i> (L.) Lam.	茜草科 Rubiaceae
別名	水線草。	
分布	台灣低海拔地區，亞洲南部及東南部、非洲、美洲等熱帶地區。	
形態	一年生草本。莖直立、平臥或斜升，多分枝，光滑無毛或疏被細毛。單葉，對生；線形或線狀披針形；單脈；具細剛毛緣；托葉著生葉柄間，連生成鞘狀。花兩性，聚繖花序，頂生或腋生，1~8 朵花，總花梗和花梗細長；花冠漏斗狀，白色或淡紫紅色，4 裂，喉部被毛。蒴果球形，先端具宿存萼裂片。	
採集	夏季、秋季採集全草。	
功效	1、全草具清熱、解毒之效。(邱年永等，1986) 2、全草具利尿、消腫之效。(林國華，1987)	
主治	1、全草治闌尾炎、瘧疾、燙傷、無名腫毒等。(邱年永等，1986) 2、全草治扁桃腺炎、咽喉炎、氣管炎、泌尿系統感染、跌打損傷、毒蛇咬傷、瘡癤癰腫等。(林國華，1987)	
毒性	無。	
禁忌	不詳。	

<b>479</b> 白花蛇舌草	<i>Hedyotis diffusa</i> Willd.	茜草科 Rubiaceae
別名	龍吐珠、珠仔草、定經草。	
分布	台灣低海拔地區，熱帶亞洲至日本等。	
形態	一年生草本。莖、枝纖細，粗糙，直立、平臥或斜升，由基部分枝。單葉，對生；線形或線狀披針形；單脈；表面光滑無毛，背面略粗糙；全緣；托葉 2，基部連生，先端具刺毛，可與擬定經草之無刺毛區別之。花兩性，1~2 朵，腋生，無柄或具粗短柄；花冠漏斗狀，白色，4 裂，喉部無毛，可與繖花龍吐珠之被毛區別之；雄蕊無花絲，可與纖花耳草具花絲區別之。蒴果扁球形，先端具宿存萼裂片。	

採集	夏季、秋季採集全草。
功效	1、全草具抗菌、消炎、抗癌之效。(李世文等，2005) 2、全草具解熱、明目、強壯、散血、消腫、止痛之效。(甘偉松，1983) 3、全草具清熱、利濕、解毒之效。(邱年永等，1983) 4、全草具活血、利尿之效。(黃兆勝，2005)
主治	1、全草治扁桃腺炎、咽喉炎、闌尾炎、肝炎、腸炎、盆腔炎等。(羅獻瑞等，2003) 2、全草治小便不利、瘰癧、一般疣等。(黃兆勝，2005) 3、全草治眼疾、腸癌等。(鄭炳全等，1979) 4、全草治瘡癤癰腫、跌打損傷、毒蛇咬傷、膽石症等。(林國華，1987) 5、全草治胃癌、肝癌、眼結膜、痢疾等。(邱年永等，1983)
毒性	不詳。
禁忌	不詳。

480 南投涼喉茶	<i>Hedyotis hedyotide</i> (DC.) Merr.	茜草科 Rubiaceae
別名	牛白藤、土加藤、涼喉茶。	
分布	台灣中部低海拔山區之林緣、疏林中或灌叢中，中國南部等。	
形態	多年生纏繞（左、右旋）草質蔓藤。老莖圓柱狀，粗糙，嫩莖具4稜，被柔毛。單葉，對生，紙質；卵狀披針形；長4~10cm，寬2~4cm；基部近圓形或闊楔形，先端漸尖；側脈於表面凹入，於背面凸起，均明顯；全緣；表面無毛，背面僅脈上被毛；托葉截頭狀，先端具4~6刺毛狀裂片。花兩性，聚繖狀圓錐花序，頂生或腋生，花小，多數，白色；花萼鐘形，外側密被毛，4裂；花冠長鐘形，4裂，近喉部被毛；雄蕊4，伸出花冠外；子房下位，2室；花柱線狀。蒴果球形，徑0.2~0.3cm，具宿存萼。	
採集	全年採集全草，乾品。	
功效	1、全草具清熱解暑、祛風除濕、消腫散瘀、清涼解毒、通經活絡、接筋續骨之效。(江蘇新醫學院，2005) 2、全草具疏風解表、消腫止血、解暑涼血之效。(邱年永等，1995)	
主治	1、全草治風濕性關節痛、痔瘡出血、瘡癤癰腫、跌打損傷等。(羅獻瑞等，2000) 2、全草治胃腸炎、皮膚濕疹、感冒咳嗽等。(林國華，1987) 3、全草治腰腿疼痛、帶狀疱疹、骨折、中暑等。(譚樹輝等，2004) 4、全草治癩痧、嘔吐、胃痛、癰癤、五癆七傷等。(江蘇新醫學	

		院，2005) 5、全草治腹痛、腹瀉、腰肌勞損、皮膚瘙癢等。(邱年永等，1995)
毒	性	不詳。
禁	忌	不詳。

<b>481</b>		
小葉傘花樹	<i>Morinda parvifolia</i> Bartl.	茜草科 Rubiaceae
別名	紅珠藤、百眼藤。	
分布	台灣中、南部低海拔之潤葉樹林中，中國南部、印度、菲律賓等。	
形態	常綠纏繞（右旋）木質蔓藤。莖黑褐色，嫩枝被短毛。單葉，對生，略革質；橢圓形、長橢圓形、狹倒卵形或長橢圓狀披針形；長 2.4~5.8cm，寬 1~2.5cm；先端漸尖或銳尖，基部楔形；全緣；葉脈於葉背呈綠色；葉面光滑無毛，具光澤，葉背腋窩被叢毛外，餘光滑無毛；托葉著生葉柄間，基部合生。花雜性，雌雄異株，聚繖花序排列成頭狀，簇生，頂生，被毛；花冠短鐘狀，黃色或綠白色，4~5 裂。核果聚成聚合果，球形，徑約 1cm，熟時橙紅色或紅色。	
採集	全年採集根、莖，鮮品或乾品。	
功效	1、根具祛風濕、消腫、去毒、暖腎氣之效。(江蘇新醫學院，2005) 2、根、莖具清熱解毒、散瘀止痛、祛風鎮咳、利濕消積之效。(邱年永等，1986)	
主治	1、根治腎虛腰痛、關節風濕痛等。(江蘇新醫學院，2005) 2、根莖治百日咳、支氣管炎、消化不良、腹瀉、便秘、跌打損傷、風濕關節痛等。(邱年永等，1986)	
毒	性	
禁	忌	

<b>482</b>		
傘花樹	<i>Morinda umbellata</i> L.	茜草科 Rubiaceae
別名	羊角藤。	
分布	台灣西部低海拔山區之林緣或灌叢中，中國南部、馬來西亞、菲律賓、琉球等。	
形態	常綠纏繞（右旋）木質蔓藤，全株光滑無毛。單葉，對生，紙質；葉形頗富變化，長橢圓形、橢圓形、潤倒卵形至線狀披針形；長 7~12cm，寬 3~6cm；先端漸尖或短凸尖，基部楔形；葉	

		脈於葉背紅褐色，兩面光滑無毛；托葉著生於葉柄間，基部合生。花雜性，雌雄異株，聚繖花序排列成頭狀，簇生，頂生；花冠短鐘狀，黃色、白色或綠白色，4~5 裂。核果聚成聚合果，球形，徑 0.5~1.6cm，成熟時橙紅色或紅色。
採集		全年採集根、莖，鮮品或乾品。
功效		1、根具祛風濕、消腫、去毒、暖腎氣之效。(江蘇新醫學院，2005) 2、根、莖具清熱解毒、散瘀止痛、祛風鎮咳、利濕消積之效。(邱年永等，1986)
主治		1、根治腎虛腰痛、關節風濕痛等。(江蘇新醫學院，2005) 2、根、莖治百日咳、支氣管炎、消化不良、腹瀉、便秘、跌打損傷、風濕關節痛等。(邱年永等，1986)
毒性		不詳。
禁忌		不詳。

483 玉葉金花	<i>Mussaenda parviflora</i> Miq.	茜草科 Rubiaceae
別名	山甘草、白紙扇。	
分布	台灣低、中海拔山區，中國等。	
形態	常綠纏繞（左旋）木質蔓藤。莖常散生皮孔，嫩枝綠色，被短毛。單葉，對生，偶有輪生者；葉形頗富變化，橢圓狀長橢圓形、卵形、潤卵形或卵狀披針形等；表面深綠色，疏被毛，背面淡綠色，密被短柔毛；全緣或略皺曲；托葉著生葉柄間，2 裂，裂片線形，脫落後留下環狀毛絨。花兩性，聚繖花序，頂生，被柔毛；花萼鐘形，5 裂，裂片線形，被柔毛，其中之一裂片增大，稱為葉狀萼，初時白色，後漸變為黃白色或淡黃綠色；花冠漏斗狀，金黃色，先端 5 裂。漿果橢圓形，無毛，熟時紫黑色。	
採集	全年採集根、莖、葉。	
功效	1、根具清熱利濕、固肺滋腎、和血解毒之效。(邱年永等，1992) 2、莖、葉具解表消暑、活血化瘀、涼血解毒之效。(邱年永等，1992)	
主治	1、根治瘧疾等。(甘偉松，1981) 2、根莖治支氣管炎、咽喉疼痛、扁桃腺炎、腸炎、腎炎、水腫等。(高木村，1996) 3、莖、葉治感冒、中暑、子宮出血、毒蛇咬傷等。(林國華，1987) 4、葉治惡瘡腫毒、食物中毒等。(邱年永等，1992)	
毒性	無	

禁忌	虛寒作瀉者忌用。(林國華，1987)
----	--------------------

484 毛雞屎藤	<i>Paederia cavaleriei</i> H. Le'vl.	茜草科 Rubiaceae
別名	白雞屎藤。	
分布	台灣低海拔山區之林緣或灌叢中，中國中部及南部等。	
形態	多年生纏繞（左旋）草質蔓藤。全株除老莖外，其餘部份密被白色柔毛。單葉，對生，紙質；卵形、卵狀長橢圓形至披針形，葉形和大小頗富變化；長 3~15cm，寬 2~10cm；基部圓形至淺心形，先端銳尖至漸尖；全緣；表面綠色，無光澤，被白色柔毛，背面淡綠色，被白色柔毛；揉碎聞之具臭味。花兩性，聚繖狀圓錐花序，頂生或腋生，小花多數，近無梗；花萼鐘狀；花冠長筒形，白色，喉部紅紫色，先端 5 淺裂；雄蕊 5，著生花冠喉部；子房下位，2 室。核果球形，徑 0.5~0.7cm，熟時稻稈色，具光澤。	
採集	全年採集根、全草；秋季採集果實，乾品。	
功效	1、根、全草具化痰止咳、消積化食、祛風除濕、散瘀調經、解毒消腫之效。(邱年永等，1995) 2、果實具消腫止痛之效。(江蘇新醫學院，2005)	
主治	1、根、全草治黃疸、肝炎、積食飽脹、婦女血虛經少、肝脾腫大、紅白痢等。(江蘇新醫學院，2005) 2、根、全草治咳嗽、小兒疳積、風濕關節痛、慢性氣管炎、癰腫、蜂窩組織炎、睪丸炎、腳氣疼痛等。(邱年永等，1995) 3、果汁治瘡毒、腫痛等。(邱年永等，1995)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	

485 雞屎藤	<i>Paederia foetida</i> L.	茜草科 Rubiaceae
別名	牛皮凍。	
分布	台灣低、中海拔山區之林緣或灌叢中，中國中部或南部、喜馬拉雅山、印度、中南半島、馬來西亞、日本等。	
形態	多年生纏繞（左旋）草質蔓藤。莖基部木質化，光滑無毛或近無毛。單葉，對生，厚紙質；卵形至線狀披針形，葉形和大小頗富變化；長 3~12cm，寬 1~7cm；基部圓形至淺心形，先端銳尖至漸尖；全緣；表面綠色，具光澤，無毛，背面淡綠色，無	

	毛或疏被短柔毛，有時脈腋被叢毛；揉碎聞之具臭味。花兩性，聚繖狀圓錐花序，頂生或腋生，小花多數，近無柄；花萼鐘狀；花冠長筒形，白色，喉部紅紫色，先端 5 裂；雄蕊 5，著生花冠喉部；子房下位，2 室。核果球形，徑 0.5~0.7cm，熟時稻桿色，具光澤。
採集	全年採集根或全草，秋季採集果實，乾品。
功效	1、全草具祛風、止痛、解毒、除濕、消食之效。(羅獻瑞等，2000) 2、全草具祛風活血、化濕消積、解毒、止痛之效。(李永春等，2001) 3、全草具祛風活血、止痛解毒、除濕、消腫、消食導滯、止痢鎮咳之效。(邱年永等，1983)
主治	1、全草治久年咳嗽、月內風、痢疾、感冒咳嗽等。(吳進錫，1981) 2、全草治食積腹瀉、小兒疳積、白帶腹脹、小兒脫肛、盲腸炎等。(江蘇新醫學院，2005) 3、全草治風濕骨痛、跌打損傷、無名腫毒、消化不良等。(羅獻瑞等，2000) 4、全草治疔瘡腫毒、毒蟲咬傷、黃疸型肝炎等。(李永春等，2001) 5、全草治有機磷農藥中毒、背癱、慢性骨髓炎等。(邱年永等，1983) 6、果汁治毒蟲螫傷、凍瘡等。(江蘇新醫學院，2005)
毒性	不詳。
禁忌	不詳。

486 九節木	<i>Psychotria rubra</i> (Lour.) Poir.	茜草科 Rubiaceae
別名	山大刀、山大顏。	
分布	台灣低海拔山區之潤葉樹林中，中國南部、海南島、琉球、日本等。	
形態	常綠灌木。莖灰褐色，具膨大之節，嫩枝綠色，略四方形，光滑無毛，小枝茶褐色，圓柱狀。單葉，對生，近革質；長橢圓形或倒披針狀長橢圓形；長 10~20cm，寬 3~7cm；基部漸狹連接成葉柄，先端銳尖或鈍凸尖；全緣；側脈於表面凹入；表面深綠色，具光澤，光滑無毛，背面淡綠色，脈腋被叢毛；托葉潤三角形，茶褐色。花兩性，聚繖狀圓錐花序，頂生或腋生；花萼倒圓錐形，先端淺 5 裂或近截形；花冠潤鐘形白色或淡綠白色，潤鐘形，5 裂，喉部密被白毛；雄蕊 5；子房下位，2 室。核果近球形，徑 0.5~0.8cm，熟時紅色，表面具光澤。	



採集	全年採集根、嫩枝和嫩葉，乾品。
功效	1、根具祛風除濕、消腫解毒、散瘀止痛、接骨生肌之效。(江蘇新醫學院，2005) 2、根、葉具清熱解毒、活血散瘀、祛風除濕之效。(蕭步丹，2003) 3、莖、枝、葉具清熱解毒、消腫拔毒之效。(羅獻瑞等，2000)
主治	1、根治風火牙痛、痔瘡、咽喉疼痛、感冒發熱等。(邱年永等，1983) 2、根治瘧疾、白喉、扁桃腺炎、風濕骨痛、跌打損傷、毒蛇咬傷等。(江蘇新醫學院，2005) 3、葉治跌打損傷、外傷出血、痔漏等。(蕭步丹，2003) 4、葉治瘡癤、骨折、刀傷出血、白喉等。(邱年永等，1983) 5、嫩枝、嫩葉治白喉、扁桃腺炎、瘡瘍腫毒、風濕骨痛、跌打損傷等。(江蘇新醫學院，2005)
毒性	不詳。
禁忌	血虛腸胃潰瘍者慎用；煎煮勿用鐵器。(吳進錫，1984)

487 拎壁龍	<i>Psychotria serpens</i> L.	茜草科 Rubiaceae
別名	匍匐九節、穿根藤。	
分布	台灣低海拔山區之森林中樹幹上或岩壁上，中國南部、日本等。	
形態	常緣攀緣木質蔓藤。全株光滑無毛；莖多分枝，節長不定根，藉以攀緣他物延伸生長，嫩枝綠色或白綠色。單葉，對生，厚紙質略帶肉質；卵形、心形、倒卵形或橢圓形，先端銳尖至圓鈍；全緣；兩面側脈不明顯；托葉膜質，著生於葉腋基部，合生，早落。花兩性，聚繖狀圓錐花序，頂生；花萼倒圓錐形，5裂；花冠潤鐘形，白色，5裂，裂片反捲，喉部被柔毛；雄蕊5，著生於花冠喉部；子房2室，每室胚珠1。核果近球形，徑0.5~0.6cm，熟時白色。	
採集	全年採集全株，乾品，全年採集根，鮮品。	
功效	1、全株具祛風止痛、舒筋活絡之效。(羅獻瑞等，2000) 2、全株具祛風濕、壯筋骨、止痛、消腫之效。(譚樹輝等，2004) 3、全株具祛風濕、壯筋骨、消腫毒、止痛、行血、消炎之效。(邱年永等，1983) 4、全株具止痛、消炎、解毒、消腫、止痛、祛風濕、壯筋骨、舒筋活絡之效。(江蘇新醫學院，2005)	
主治	1、全株治風濕性關節炎、腰腿疼痛、跌打損傷、疝積等。(羅獻瑞等，2000)	

	2、全株治反胃口噎膈、咽喉腫痛、癰腫、瘡疥、小便渾濁等。 (邱年永等，1983)
	3、全株治腸風下血、毒蛇咬傷、頭痛、氣痛、風濕關節痛、小兒疳積等。(江蘇新醫學院，2005)
	4、鮮根治喉痹、痔痛等。(江蘇新醫學院，2005)
<b>毒 性</b>	不詳。
<b>禁 忌</b>	孕婦忌服；便燥者勿多服。(吳進錫，1980)

<b>488</b>	<i>Rubia akane</i> Nakai	茜草科 Rubiaceae
<b>茜 草</b>	紅根仔草、金線草。	
<b>別 名</b>	紅根仔草、金線草。	
<b>分 布</b>	台灣低、中海拔地區，中國、韓國、日本等。	
<b>形 態</b>	多年生攀緣草質蔓藤，全株具倒鉤細刺。根紫紅色或橙紅色，故名之。莖纖細，方形，具縱稜和倒鉤細刺，質脆易折，開花、結果時多分枝。單葉，與葉狀之托葉 4~12 枚輪生，大小不一；卵狀心形；基部心形；5 出脈，脈上具倒鉤細刺；葉緣亦具倒鉤細刺；葉柄長短不一，亦具倒鉤細刺。花兩性，聚繖狀圓錐花序，頂生或腋生；花冠白色或淡黃色，5 裂。漿果近球形，熟時黑色。	
<b>採 集</b>	春季、秋季採集根。	
<b>功 效</b>	1、根具通經、行血、利尿、消瘀、鎮痛、強壯之效。(甘偉松，1981) 2、根具活血、涼血、止血之效。(羅獻瑞，2003)	
<b>主 治</b>	1、根治風濕性關節炎、跌打損傷等。(黃兆勝等，2004) 2、根治咯血、吐血、月經不順、月經閉止、黃疸、水腫、小兒及孕婦軟骨病等。(甘偉松，1981) 3、根治衄血、尿血、便血、肝炎、慢性支氣管炎等。(林國華，1987) 4、根治蕁麻疹、疔瘡等。(邱年永等，1983)	
<b>毒 性</b>	無	
<b>禁 忌</b>	不詳。	

<b>489</b>	<i>Rubia lanceolata</i> Hayata	茜草科 Rubiaceae
<b>金 劍 草</b>	披針葉茜草。	
<b>別 名</b>	披針葉茜草。	
<b>分 布</b>	特產台灣中、高海拔山區。	

形 態	多年生攀緣草質蔓藤，全株具倒鉤細刺。莖纖細，方形，具縱稜和倒鉤細刺。單葉，4 枚輪生；披針形或長橢圓狀披針形；基部心形；3 出脈，脈上具倒鉤細刺；葉緣具倒鉤細刺；葉柄細長，亦具倒鉤細刺。花兩性，聚繖花序或圓錐花序，頂生或腋生；花冠白色，5 裂。漿果球形，熟時紫黑色。
採 集	春季、秋季採集根、莖、葉。
功 效	1、根具和血、通經、解熱、利尿之效。(張憲昌，1997) 2、莖、葉具涼血、行血、調經、解熱、利尿之效。(張憲昌，1997)
主 治	1、根治淋病、出血症、小兒驚風、小便不利、月經不順等。(邱年永等，1983) 2、根治腹痛、感冒、小兒發育不良、跌打損傷等。(張憲昌，1997) 3、莖、葉治眼疾、血熱、癰疽瘡癤等。(張憲昌，1997)
毒 性	無。
禁 忌	不詳。

490 六 月 雪	<i>Serissa serissoides</i> (DC.) Druce	茜草科 Rubiaceae
別 名	白馬骨、曲節草。	
分 布	台灣低、中海拔山區之森林林緣或空曠地，中國、日本等。	
形 態	常綠灌木。株高 50~100cm，多枝，被毛或近光滑。單葉，對生，密生於小枝短節上，似叢生狀，紙質；橢圓形至長橢圓形；長 1~2cm，寬 0.3~0.6cm；基部漸狹，先端銳尖；全緣；托葉與葉柄連生，基部較潤，先端分裂成數枚針刺狀裂片。花兩性，簇生於枝梢或近先端之葉腋，白色或帶淡紫紅色，無梗；花萼鐘形，5 深裂；花冠管狀漏斗形，5 裂，反捲，喉部密被白色長毛；雄蕊 10；雌花 2 型，長花柱長於雄蕊，短花柱短於雄蕊；子房下位，2 室；柱頭 2 裂。核果球形，具 2 分核，各藏種子 1。	
採 集	全年採集全株，乾品。	
功 效	1、全株具疏風解表、清熱利濕、解毒消腫之效。(李永春等，2001) 2、全株具健脾利濕、舒肝活血之效。(羅獻瑞等，2000) 3、全株具祛風、利濕、清熱、解毒之效。(邱年永等，1983) 4、全株具平肝、利濕、健脾、止瀉、消積滯、舒經活絡之效。(江蘇新醫學院，2005)	
主 治	1、全株治小兒疳積、經閉、白帶、急慢性肝炎等。(羅獻瑞等，2000) 2、全株治感冒、咳嗽、急性扁桃腺炎、咽喉炎、腸炎、痢疾、水腫、癰腫、毒蛇咬傷等。(李永春等，2001)	

	3、全株治目赤腫痛、偏頭痛、牙痛、鵝口瘡、濕熱黃疸、白濁等。(邱年永等，1983)
	4、全株治療癩、小兒驚風、傷寒、中暑、狂言亂語、吐血、刀傷、痔瘡等。(江蘇新醫學院，2005)
<b>毒 性</b>	不詳。
<b>禁 忌</b>	不詳。

<b>491</b>	<i>Uncaria hirsuta</i> Havil.	茜草科
<b>台 灣 鉤 藤</b>		Rubiaceae
<b>別 名</b>	雙鉤藤、毛鉤藤。	
<b>分 布</b>	台灣低、中海拔山區之林緣或灌叢中，中國等。	
<b>形 態</b>	常綠攀緣木質蔓藤。全株被毛；根肥厚質軟，味苦刺喉；莖枝四方形。單葉，對生，紙質；卵狀橢圓形；長 9~15cm，寬 4~6cm；基部淺心形，先端漸尖或長尾尖；全緣；側脈於表面凹入明顯；全緣；兩面被褐色粗毛；葉柄被毛；葉腋具 1~2 鉤刺；托葉每節 4 枚，具緣毛。花兩性，頭狀花序，腋生，徑 2.5~4.5cm，花多數而密生，具長梗，近先端處具苞片 4，2 大 2 小，輪生；花萼短筒狀，5 深裂；花冠高杯形，綠白色，5 裂；雄蕊 5，著生於花筒先端裂片間；花柱伸出花冠甚長；柱頭棒狀，徑粗於花柱。蒴果紡錘形，長 1.5~1.8cm，徑 0.4~0.7cm，胞間開裂；種子多數，細小，兩端具翅。	
<b>採 集</b>	全年採集根；春季、秋季採集嫩莖上的鉤刺，乾品。	
<b>功 效</b>	1、根具舒筋活絡、清熱消腫之效。(江蘇新醫學院，2005) 2、帶鉤刺之嫩莖具清熱平肝、熄風定驚、鎮靜降壓之效。(林國華，1997)	
<b>主 治</b>	1、根治風濕性關節炎，坐骨神經痛、精神分裂症、妊娠水腫、半身不遂等。(邱年永等，1983) 2、帶鉤刺之嫩莖治驚厥、抽搐、頭暈目眩等。(蕭步丹，2003) 3、帶鉤刺之嫩莖治高血壓、痙攣抽搐、頭暈目眩等。(李永春等，2001) 4、帶鉤刺之嫩莖治胎動不安、顏面神經麻痺、全身麻木、鼻血不止、精神昏悶等。(江蘇新醫學院，2005)	
<b>毒 性</b>	不詳。	
<b>禁 忌</b>	最能益氣，虛者勿投；無火者勿服。(江蘇新醫學院，2005)	

492 恒春鉤藤	<i>Uncaria lanosa</i> Wall. var. <i>appendiculata</i> Ridsdale	茜草科 Rubiaceae
別名		
分布	台灣恆春半島、蘭嶼和綠島之林緣或灌叢中，菲律賓、麻六甲等。	
形態	常緣攀緣木質蔓藤。小枝、葉柄、葉及花序被毛；莖枝略方形。單葉，互生，紙質；卵狀橢圓形；長 7~11cm，寬 4~6cm；基部圓形或截形，先端漸尖；全緣；側脈於表面凹入明顯；表面無毛或僅脈上疏被毛，背面疏被毛；葉柄被毛；葉腋具 1~2 鉤刺；托葉大，卵形，2 裂，具耳垂，被剛毛。花兩性，頭狀花序，腋生，徑 2~3.6cm，花多數而密生，具長梗，先端處具苞片 4~5；花萼略壺狀，5 深裂；花冠高杯形，黃色，5 裂；雄蕊 5，著生於花筒先端裂片間；花柱伸出花冠甚長；柱頭棒狀，徑粗於花柱。蒴果紡錘形，熟時淡褐色。	
採集	全年採集根；春季、秋季採集嫩莖上的鉤刺，乾品。	
功效	1、根治具舒筋活絡、清熱消腫之效。(江蘇新醫學院，2005) 2、帶鉤刺之嫩莖具清熱平肝、熄風定驚、鎮靜降壓之效。(林國華，1997)	
主治	1、根治風濕性關節炎，坐骨神經痛、精神分裂症、妊娠水腫、半身不遂等。(邱年永等，1983) 2、帶鉤刺之嫩莖治驚厥、抽搐、頭暈目眩等。(蕭步丹，2003) 3、帶鉤刺之嫩莖治高血壓、癲厥抽搐、頭暈目眩等。(李永春等，2001) 4、帶鉤刺之嫩莖治胎動不安、顏面神經麻痺、全身麻木、鼻血不止、精神昏悶等。(江蘇新醫學院，2005)	
毒性	不詳。	
禁忌	最能益氣，虛者勿投；無火者勿服。(江蘇新醫學院，2005)	

493 平原菟絲子	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.	旋花科 Convolvulaceae
別名		
分布	台灣低海拔之潤葉樹林樹冠層，廣泛分布全球。	
形態	一年生寄生草質蔓藤。莖絲狀，光滑無毛，黃色至橙色，無斑點，多分枝，右旋纏繞延伸生長，形成吸器寄生於寄主之莖、葉、花、果實吸取水份和養份，寄生在高大寄主者，分枝嫩莖懸垂，先端微翹，可隨風搖擺到旁邊之寄主纏繞之，亦可繼續向下延伸，垂到地面纏繞低矮之寄主。無葉或退化成鱗片狀。	

	花兩性，簇生或短總狀花序，花梗短，花冠白色，短鐘狀，徑0.25~0.3cm，裂片5，向外反折，先端銳尖，可與菟絲子之裂片真立，先端圓形，區別之；花絲分離，伸出花冠筒；花柱2，細長，柱頭頭狀。蒴果扁球形，僅基部為宿存花被所包被，可與菟絲子的下半部為宿存花被所包被，區分之。
採集	夏季、秋季採集全草。
功效	1、全草具清熱、涼血、利水、解毒之效。(邱年永等，1983) 2、種子具補肝腎、益精髓、明目、消渴之效。(邱年永等，1983)
主治	1、全草治陽痿遺精、吐血、便血、衄血、血崩、痢疾、黃疸、癰疽、疔瘡等。(邱年永等，1983) 2、種子治腰膝酸痛、遺尿、尿血、目暗等。(邱年永等，1983)
毒性	不詳。
禁忌	不詳。

<b>494</b> 台灣菟絲子	<i>Cuscuta japonica</i> Choisy var. <i>formosana</i> (Hayata) Yunck.	旋花科 Convolvulaceae
別名		
分布	台灣低、中海拔之森林中，中國中部和南部等。	
形態	一年生寄生草質蔓藤。莖圓柱形，黃色，帶紫色斑點。無葉。花兩性，穗狀花序，花無梗，花冠長筒狀，先端5裂，裂片直立或向外反折；子房球形；花柱1；柱頭2歧。瘦果卵球形。	
採集	夏季、秋季採集全草。	
功效	1、全草具清熱、涼血、利水、解毒之效。(邱年永等，1983) 2、種子具補肝腎、益精髓、明目之效。(邱年永等，1983)	
主治	1、全草治吐血、衄血、便血、血崩、淋濁、帶下、痢疾、黃疸、熱毒麻疹、癰疽、疔瘡等。(邱年永等，1983) 2、種子治腰膝酸痛、尿血、遺尿、消渴、目暗等。(邱年永等，1983)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	

<b>495</b> 馬蹄金	<i>Dichondra micrantha</i> Urb.	旋花科 Convolvulaceae
別名	金鎖匙。	
分布	台灣低海拔地區，中國、亞洲東部、太平洋諸島、美洲南部及北部、加勒比海地區等。	
形態	多年生匍匐草本。全株疏被白毛。莖纖細，多分枝，節之表面長葉，背面生根。單葉，互生；圓形或腎形；基部彎缺，兩緣重疊或不重疊，先端微凹；全緣；具長柄，被毛。花兩性，單朵腋生；花冠鐘形，5裂，白色或黃色，被長毛。蒴果近球形，短於宿存花萼，被長毛。	
採集	全年採集全草，乾品或鮮品。	
功效	1、全草具祛風，解熱，消炎之效，亦為兒科良藥。(甘偉松，1981) 2、全草具利尿、活血、解毒之效。(邱年永等，1986) 3、全草具利濕、消腫之效。(蕭步丹，2003)	
主治	1、全草治肝炎、腎炎、膀胱結石、膽結石等。(林國華，1987) 2、全草治黃疸、痢疾、疔瘡腫毒、跌打損傷等。(羅獻瑞等，2003) 3、全草治小兒胎毒、眼目赤痛、尿血、毒蛇咬傷等。(邱年永等，1986) 4、全草治遺精、尿濁、高血壓、胃腸發炎等。(吳青鋈，1984)	
毒性	無	
禁忌	胃寒者勿長期使用鮮品。(吳青鋈，1984)	

<b>496</b> 亨利氏 伊立基藤	<i>Erycibe henryi</i> Prain	旋花科 Convolvulaceae
別名	丁公藤、包公藤。	
分布	台灣低海拔山區之林緣或灌叢中，中國南部、琉球、日本南部等。	
形態	常緣纏繞（右旋）木質蔓藤。老莖淡褐色，外皮鬆軟，嫩枝綠色，具稜，無毛。單葉，互生，略革質；卵狀橢圓形至倒卵形；長6~12cm，寬4~6cm；基部圓形或楔形，先端鈍凸尖；花兩性，圓錐花序，頂生或腋生，被淡褐色柔毛，具小苞片；萼片5，被毛，宿存；花冠潤鐘形，5深裂，白色；雄蕊5，著生於花冠筒基部，與花冠裂瓣互生；子房上位，1室；柱頭斗笠狀。漿果略肉質，長橢圓形或卵球形，熟時黑紫色，長約1.8cm，徑1~1.2cm，光滑無毛；種子1。	

採集	全年採集根、莖，乾品。
功效	1、根、莖具解表、發汗、驅風濕、除痹痛之效。(高木村，1992) 2、根、莖具祛風去濕、舒筋活筋、消腫止痛之效。(邱年永等，1992) 3、根、莖具解表、發汗、驅風濕、除痹痛、消腫止痛等。(江蘇新醫學院，2005)
主治	1、根、莖治風濕骨痛、神經痛、半身不遂等。(邱年永等，1996) 2、根、莖治風濕痹痛、半身不遂、跌打腫痛、青光眼等。(羅獻瑞等，2000) 3、根、莖治風濕性關節炎、類風濕關節炎、坐骨神經痛、無名腫毒等。(江蘇新醫學院，2005)
毒性	不詳。
禁忌	孕婦忌服。(江蘇新醫學院，2005)

497 土丁桂	<i>Evolvulus alsinoides</i> (L.) L.	旋花科 Convolvulaceae
別名	銀絲草。	
分布	台灣海岸草地及低、中海拔山區之草原，亞洲、非洲及澳洲熱帶地區、美洲南部及北部等。	
形態	多年生匍匐草本。全株被毛，株高 15~30cm。莖基多分枝，直立或斜升。單葉，互生，軟紙質；卵形或橢圓形；長 0.8~2.5cm，寬 0.4~1.2cm；全緣；兩面密被白色長絨毛。花兩性，單生或 2~3 朵聚繖花序，腋生；萼片 5，被柔毛；花冠漏斗狀，藍色或淡藍白色，徑 0.6~1cm，5 淺裂；雄蕊 5；子房上位，2 室，每室 2 胚珠；花柱 2，各 2 分叉。蒴果近球形，具宿存萼，熟時 4 瓣開裂。	
採集	全年採集全草，乾品。	
功效	1、全草具止咳平喘、清熱利濕、散瘀止痛之效。(羅獻瑞等，2000) 2、全草具清熱、利濕、澀精益陽之效。(邱年永等，1983) 3、全草具止血清腫、清肝熱、退翳、清熱瀉火、潤精益陽之效。(江蘇新醫學院，2005)	
主治	1、全草治肝病、胃腸虛弱等。(吳進錫，1981) 2、全草治黃疸、咳血、痢疾、夢遺滑精、淋濁白帶等。(高木村，1996) 3、全草治遺尿症、小兒疳積、疔瘡、疥瘡、蛇咬傷等。(邱年永等，1983) 4、全草治肺熱喘咳、濕熱黃疸、瀉泄、膀胱濕熱、小便短澀、	



	跌打瘀積等。(羅獻瑞等，2000)
毒 性	不詳。
禁 忌	不詳。

<b>498</b>	<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) R.Br. subsp. <i>brasiliensis</i> (L.) Oostst.	旋花科 Convolvulaceae
馬 鞍 藤		
別 名	厚藤、二葉紅薯。	
分 布	台灣沿海地區，中國兩廣及福建沿海、熱帶沿海地區等。	
形 態	多年生匍匐草本。全株光滑無毛。莖匍匐，常帶紫紅色，具乳汁，節之表面長葉，背面生根。單葉，互生，革質；馬鞍形，故名之。花兩性；花冠漏斗形，白色或紫紅色，先端 5 淺裂。蒴果卵圓形，熟時 4 瓣裂，花萼宿存。	
採 集	全年採集全草，乾品或鮮品。	
功 效	1、全草具驅風、利尿之效。(甘偉松，1981) 2、全草具祛濕、拔毒、消腫之效。(林國華，1987)	
主 治	1、全草治風濕性關節炎、風火牙痛、濕疹、無名腫毒、癰疽疔瘡。(林國華，1987) 2、全草治神經痛、淋病等。(甘偉松，1981) 3、全草治痔瘡下血、癰瘡癰腫等。(林國華，1987) 4、全草治腎虛、遺精、白濁等。(吳進鋈，1980)	
毒 性	無。	
禁 忌	無濕痛者勿多用，不宜單味久服。(吳進鋈，1980)	

<b>499</b>	<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J. Jacq.) Druce	紫草科 Boraginaceae
細 纓 子 草		
別 名	細莖斑種草	
分 布	台灣低、中海拔山區之空曠地，中國東部、韓國、日本、菲律賓、印尼、印度、越南、巴基斯坦、阿富汗等。	
形 態	一年至二年生草本。株高 15~30cm，全株被毛。莖基部多分枝成叢生狀，下部平臥，上部斜升。單葉，互生，膜質；卵形或橢圓形；長 1~4cm，寬 0.4~1.8cm；兩面被毛。花兩性，單生於葉腋；花萼 5 深裂，外被細毛；花冠短鐘形，淡紫色或白色，5 裂，喉部具 5 鱗片；雄蕊 5，與冠裂片互生；子房上位，4 深裂；花柱短；柱頭頭狀。小堅果 4，腎形，具疤痕斑紋。	
採 集	春季、夏季採集全草。	
功 效	全草具止血、鎮咳之效。(邱年永等，1986)	

主治	1、全草治吐血、肝炎、黃疸、咳嗽等。(張憲昌，1997) 2、全草治吐血、肝病、喉痛等。(高木村，1996) 3、全草治吐血、肝病等。(邱年永等，1986)
毒性	不詳。
禁忌	不詳。

500 小葉厚殼樹	<i>Carmona retusa</i> (Vahl) Masam.	紫草科 Boraginaceae
別名	滿福木、福建茶。	
分布	台灣南部海岸山脈和蘭嶼之開潤地，中國南部、馬來西亞、中南半島、孟買、錫蘭、印度、琉球、澳洲等。	
形態	常綠灌木。多分枝，分長枝和短枝，嫩枝被剛毛。單葉，生於長枝者互生，生於短枝者叢生，略革質；倒卵形或匙形；長 1~2.5cm，寬 0.5~1cm；基部楔形或漸狹成葉柄，先端鈍形或圓形，具小突尖；葉緣上半部具不明顯鋸齒；兩面疏被剛毛，表面常具銀白色小斑點，具光澤。花兩性，聚繖花序，腋生或生於短枝上，具細長總花梗；萼片 5；花冠鐘形，白色，5 裂；雄蕊 5，略伸出花冠外；子房卵形；柱頭 2 分叉，細長。核果球形，基部具宿存萼，徑 0.4~0.5cm，熟時紅色，內藏種子 4。	
採集	全年採集根、莖，乾品；全年採集嫩葉，鮮品或乾品。	
功效	全株具利濕、行血、解毒之效。(邱年永等，1998)	
主治	1、根和莖治風濕骨痛、筋骨疼痛、咯血、便血等。(邱年永等，1998) 2、葉治療瘡等。(邱年永等，1998)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	

501 破布子	<i>Cordia dichotoma</i> G. Forst.	紫草科 Boraginaceae
別名	樹子、破布木、青銅翠木。	
分布	台灣低海拔山區之森林向陽處，中國南部、馬來西亞、新蘇格蘭、中南半島、巴基斯坦、琉球等。	
形態	半落葉喬木。嫩枝被褐色粗毛，小枝具皮孔。單葉，互生，紙質；闊卵形或披針狀卵形；長 6~15cm，寬 4~10cm；基部闊楔形或圓形，先端鈍尖；全緣或微波緣，偶具疏鈍齒緣；嫩葉兩面密被短毛，老葉僅葉背中肋被毛。花兩性，繖房狀聚繖花序，	

	頂生或腋生，黃白色；花萼鐘狀，不規則 5 裂，外被毛；花冠漏斗狀，5 裂，裂片覆瓦狀排列，向外反捲；雄蕊 5，著生於花筒；子房上位，4 室；柱頭 4 分叉。核果球形，徑 0.8~1.2cm，熟時橘紅色，基部具宿存萼，先端具宿存花柱。
採集	全年採集根、樹皮；秋季採集果實，乾品。
功效	1、根具止汗之效。(甘偉松，1981) 2、根具行氣止痛之效。(江蘇新醫學院，2005) 3、果實具鎮咳祛痰、利尿緩下之效。(吳進錫，1981)
主治	1、根治心胃氣痛等。(江蘇新醫學院，2005) 2、根治腸痢瀉下等。(吳進錫，1981) 3、根、樹皮治子宮炎、子宮脫出、久年傷、癌症等。(甘偉松，1981) 4、根、樹皮治肺出血、下消、久年撲傷等。(邱年永等，1983)
毒性	不詳。
禁忌	便秘者勿服根，體虛者勿多食。(吳進錫，1981)

502 琉璃草	<i>Cynoglossum furcatum</i> Wall.	紫草科 Boraginaceae
別名	大琉璃草、牛舌頭草、一條根。	
分布	台灣低、中海拔山區，中國南部、日本、印度、中南半島、巴基斯坦、阿富汗等。	
形態	一年生至多年生草本，全株被短毛，株高可達 1m。莖直立，單一或頂端多少分枝。根生葉和莖基之葉具翼柄，披針形至卵狀披針形，全緣；莖生葉往上漸小而稀疏，近無柄。花兩性，總狀花序，常成對呈叉狀分歧；花冠淡藍色或藍色，上部 5 裂，喉部具 5 鱗片。小堅果 4，密被鉤刺。	
採集	春季、夏季採集全草。	
功效	全草具清熱解毒、活血散瘀、消腫止痛、拔膿生肌、婦女調經之效。(邱年永等，1992)	
主治	1、全草治瘡癤腫毒、睪丸腫、刀傷出血、白帶、小兒發育不良、坐骨神經痛等。(高木村，1996) 2、全草治跌打損傷、毒蛇咬傷、肝炎、扁桃腺炎、肺癰、水腫、月經不調等。(邱年永等，1992) 3、全草治急性腎炎、牙周膿腫等。(蕭步丹，2003)	
毒性	無。	
禁忌	不詳。	

503 白水木	<i>Tournefortia argentea</i> L. f.	紫草科 Boraginaceae
別名		
分布	台灣北端、南端、蘭嶼、綠島和小琉球之海岸沙灘，泛熱帶和亞熱帶地區等。	
形態	常綠灌木或喬木。枝條灰褐色，具葉痕；嫩枝、葉和花序均被灰白色絹毛。單葉，叢生枝梢，革質；倒卵形或匙形；長 10~20cm，寬 5~8cm；基部漸狹或楔形，先端鈍形或近圓形；全緣；兩面密被灰白色絹毛。花兩性，多分歧蝎尾狀排列成聚繖花序，頂生，小花無梗，白色；花萼鐘形，被絨毛，5 裂；花冠潤鐘形，5 裂；子房上位；柱頭 2 叉。核果近球形，徑 0.5~0.8cm。	
採集	全年採集根，乾品；全年採集枝葉，鮮品或乾品。	
功效	1、根、枝具清熱、利尿、解毒之效。(邱年永等，1995) 2、葉具解毒、消腫之效。(邱年永等，1995)	
主治	1、根、枝治風濕骨痛等。(邱年永等，1995) 2、鮮葉治魚類和貝類中毒等。(甘偉松，1981)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	

504 冷飯藤	<i>Tournefortia sarmentosa</i> Lam.	紫草科 Boraginaceae
別名	藤紫丹、清飯藤、倒爬麒麟。	
分布	臺灣南部近海乾燥林中，馬來西亞、澳洲等。	
形態	常綠纏繞（右旋）木質蔓藤。嫩枝、葉、花均密被短柔毛。單葉，互生，厚紙質，粗糙；卵形至長橢圓形；葉脈於表面凹入明顯；兩面被短柔毛；全緣。花兩性，聚繖狀穗狀花序，頂生，二叉多次分歧，向外卷曲呈蝎尾狀，花小，無梗；花冠短筒狀，5 裂，綠白色。核果球形，熟時白色。	
採集	全年採集根、莖。	
功效	根、莖具祛風、解毒、消腫之效。(邱年永等，1986)	
主治	1、根治潰瘍等。(甘偉松，1981) 2、根、莖治風傷骨節疼痛、風濕性關節酸痛、心臟衰弱、瘀血、下消、白濁、白帶、小兒發育不良等。(邱年永等，1986)	
毒性	無。	
禁忌	不詳。	

<b>505</b> 台灣紫珠	<i>Callicarpa formosana</i> Rolfe	馬鞭草科 Verbenaceae
別名	杜虹花。	
分布	台灣低、中海拔之潤葉樹林中，菲律賓等。	
形態	半落葉灌木。小枝、葉柄、葉背及花序皆被茶褐色柔毛，枝條並被茶褐色米糠樣鱗片。單葉，對生；長卵形或長橢圓形，厚紙質，粗糙；長 8~15cm，寬 3~7cm；基部鈍形，先端尖形或漸尖形；鋸齒緣。花兩性，聚繖花序，腋生；花冠紫紅色。核果球形，徑約 3mm，熟呈紫色。	
採集	全年採根、幹，切片，曬乾。	
功效	根、幹具補腎滋水、清血、去瘀之效。(邱年永等，1983)	
主治	根、幹治風濕症、神經痛、老人手腳酸痛、喉痛、下消、白帶、眼疾等。(邱年永等，1983)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	

<b>506</b> 朝鮮紫珠	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb. var. <i>luxurians</i> Rehder	馬鞭草科 Verbenaceae
別名	韓國紫珠。	
分布	台灣北部山區，日本、韓國等。	
形態	常綠灌木。小枝、葉柄、葉背及花序，疏被柔毛。單葉，對生；卵形或橢圓形，厚紙質；長 12~18cm，寬 6~8cm；葉柄長 1.5~2cm。花兩性，腋生，聚繖花序，3~5 分枝；花冠粉紅色。核果小球形，熟時紫紅色。	
採集	全年採根、幹。	
功效	根、幹有補腎滋水，清血去瘀之效。(邱年永等，1983)	
主治	根、幹治風濕症、神經痛、老人手腳酸痛、喉痛、下消、白帶、眼疾等。(邱年永等，1983)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	

<b>507</b> 鬼紫珠	<i>Callicarpa kochiana</i> Makino	馬鞭草科 Verbenaceae
別名	枇杷葉紫珠。	
分布	台灣北部、中部低海拔山區之森林中，中國南部、越南、日本等。	
形態	常綠灌木。全株密被黃褐色長毛。單葉，對生，軟紙質；長橢圓形；長 12~25cm，寬 6~10cm；基部楔形，先端漸尖；葉緣具密鋸齒；表面脈上被毛，背面密被黃褐色茸毛，兩面均具金黃色透明腺點。花兩性，複聚繖花序，密生；花萼筒狀，4 裂，外被茸毛；花冠筒狀，淡紫紅色，4 裂；雄蕊 4，伸出花冠；子房上位，4 室；花柱細長，伸出花冠。核果球形，徑約 0.3cm，熟時白色，基部具宿存萼。	
採集	全年採集根、莖，乾品；夏季、秋季採集枝葉，鮮品和乾品。	
功效	1、根具祛風、利濕、化瘀、活血、止血之效。(邱年永等，2001) 2、葉具收斂、止血、祛風、止咳、解毒之效。(邱年永等，2001)	
主治	1、根治慢性風濕性關節炎、吐血、水腫、風濕疼痛、風寒咳嗽等。(邱年永等，2001) 2、葉治水腫、胃出血、吐血、風寒咳嗽、風寒頭痛等。(邱年永等，2001)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	

<b>508</b> 巒大紫珠	<i>Callicarpa randaiensis</i> Hayata	馬鞭草科 Verbenaceae
別名		
分布	特產台灣中、高海拔山區之森林中。	
形態	半落葉灌木。小枝、葉柄、葉背及花序，疏被柔毛。單葉，對生；狹長菱形或長橢圓狀披針形；長 8~18cm，寬 2~4cm；背面被星狀毛。花兩性，腋生，聚繖花序；花冠紫紅色。核果球形，熟呈紫紅色。	
採集	全年採根、幹。	
功效	根、幹有補腎滋水，清血去瘀之效。(邱年永等，1983)	
主治	幹、根治風濕症，神經痛，老人手腳酸痛，喉痛，下消，白帶，眼疾等。(邱年永等，1983)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	

<b>509</b> 重瓣臭茉莉	<i>Clerodendrum chinense</i> (Osbeck) Mabb. var. <i>chinense</i> (Moldenke) S. L. Chen	馬鞭草科 Verbenaceae
別名	重瓣臭牡丹。	
分布	台灣低海拔山區，中國南部和西部、亞洲熱帶地區等。	
形態	常綠灌木。嫩枝近方形，被柔毛。單葉，對生，具臭味；潤卵形或略心形；基部潤楔形；兩面被毛；葉緣具細鋸齒或粗鋸齒；具長柄。花兩性，聚繖花序，頂生，密集成球狀；花冠白色或玫瑰色，重瓣。核果近球形，熟時藍黑色，具宿存萼片。	
採集	全年採集全株。	
功效	全株具養陰清熱、宣肺祛痰、涼血止血、解毒鎮痛、強筋骨之效。(邱年永等，1998)	
主治	1、全株治肝炎、高血壓、感冒發熱、肺結核咳嗽、咳血、痢疾、子宮下垂、月經疼痛、赤白帶下、風濕性關節疼痛、跌打損傷等。(邱年永等，1998) 2、葉治乳瘡、瘡毒等。(邱年永等，1998)	
毒性	無。	
禁忌	不詳。	

<b>510</b> 臭茉莉	<i>Clerodendrum chinense</i> (Osbeck) Mabb. var. <i>simplex</i> (Moldenke) S. L. Chen	馬鞭草科 Verbenaceae
別名	臭牡丹。	
分布	台灣引進栽植馴化野生低海拔山區，原產中國南部及西南部、亞洲南部等。	
形態	常綠灌木。嫩枝近方形，被柔毛。單葉，對生，具臭味；潤卵形或卵狀三角形；基部近截形或淺心形；兩面被毛；葉緣具不規則粗鋸齒；具長柄。花兩性，聚繖花序，頂生，密集成球狀；花冠白色或玫瑰色，單瓣。核果球形，熟時藍黑色，具短於果實之宿存萼片，披針形或線狀披針形，具盾狀腺體。	
採集	全年採集根、莖、葉。	
功效	1、根具祛風除濕、療痔提肛、殺疥止癢、活血消腫之效。(譚樹輝等，2005) 2、根、莖具化痰止咳、降血壓、解毒之效。(邱年永等，1998)	
主治	1、根治風濕性關節炎、腳氣水腫、支氣管炎等。(蕭步丹，2003) 2、根治慢性骨髓炎、癱瘓、痔瘡脫肛、濕疹疥瘡等。(譚樹輝等，2005) 3、根、莖治白帶、風濕骨痛、腸癌等。(邱年永等，1998)	

		4、葉治高血壓、甲狀腺腫、癩癧等。(邱年永等，1998) 5、根、莖、葉治五毒症、風傷等。(張憲昌，1997)
毒	性	無。
禁	忌	不詳。

511		馬鞭草科
大	青	<i>Clerodendrum cyrtophyllum</i> Turcz.
別	名	臭腥公、路邊青。
分	布	台灣低海拔山區之林緣，中國、馬來西亞、越南、韓國等。
形	態	常綠灌木。小枝黃褐色，嫩枝綠色，被柔毛。單葉，對生，紙質；卵狀長橢圓形或長橢圓形；長 8~16cm，寬 3~6cm；基部圓形、闊楔形或漸尖，先端銳尖或漸尖；全緣或疏鋸齒緣，幼株者具粗鋸齒緣；兩面疏被白色短毛；葉柄長，為葉身之 1/3~1/2。花兩性，繖房狀聚繖花序，頂生或腋生，花小鬆散；花萼鐘形，被毛，5 裂；花冠管狀；子房上位；花柱細長，伸出花冠外，略長於雄蕊；柱頭 2 裂。漿果球形或倒卵球形，熟時紫藍色，基部具增大之宿存萼。
採	集	全年採集根，乾品；夏季採集枝葉，乾品。
功	效	1、根具解熱止渴、去風清血之效。(甘偉松，1981) 2、根莖具清熱解毒、淨血和血、祛風除濕、利尿消腫、抗炎鎮痛、調經理帶之效。(邱年永等，1998) 3、葉具清熱、解毒、涼血之效。(李永春等，2001) 4、葉具清熱、解毒、涼血、止血、散瘀之效。(江蘇新醫學院，2005)
主	治	1、根治月內風、月經不調、赤白帶、癩癧等。(吳進錫，1979) 2、根治風濕關節痛、黃疸、熱痢、偏頭痛等。(江蘇新醫學院，2005) 3、葉治淋巴腺炎、喉風喉痹等。(邱年永等，1998) 4、葉治丹毒、疔瘡腫毒、毒蛇咬傷、肺炎、扁桃腺炎、急性腸胃炎、吐血、衄血等。(李永春等，2001)
毒	性	不詳。
禁	忌	脾胃虛寒者忌服。(江蘇新醫學院，2005)

512		馬鞭草科
苦	林	<i>Clerodendrum inerme</i> (L.) Gaertn.
別	名	苦藍盤、苦郎樹。



分 布	台灣沿海地區，中國、琉球、亞洲南部及東南部、澳洲等。
形 態	直立灌木或蔓藤狀，高 1~2m，莖皮灰色，嫩枝黃灰色，被柔毛。單葉，對生，近革質；橢圓形至卵形，無毛，具小腺點；基部楔形，先端鈍形；全緣。花兩性，聚繖花序，腋生，3~7 朵，白色；花冠高狀杯，5 裂；雄蕊紫色，伸出花冠外。核果，倒卵形，熟時藍黑色。
採 集	全年採集根、枝、葉。
功 效	根、枝、葉具去瘀消腫、祛風、除濕、殺蟲、清熱解毒、散瘀活絡、止血止癢之效。(邱年永等，1983)
主 治	根、枝、葉可治腳風、神經痛、風濕病、風濕性關節炎、坐骨神經痛、皮膚濕疹、疥癬、跌打瘀腫、腰扭傷、外傷出血。(邱年永等，1983)
毒 性	枝葉有毒。
禁 忌	勿服用，慎用。(邱年永等，1983)

513 龍 船 花	<i>Clerodendrum kaempferi</i> (Jacq.) Sieb. ex Steud.	馬鞭草科 Verbenaceae
別 名	楨桐。	
分 布	台灣低海拔地區，中國南部、印度、斯里蘭卡、安達曼群島、馬來西亞、中南半島地區等。	
形 態	常綠灌木，高 1~3m。莖被細柔毛，嫩枝近方形。單葉，對生；心形或潤卵形；近全緣或具疏鋸齒或 3~5 淺裂。花兩性，圓錐花序，頂生，深紅色；花冠長筒形；雄蕊 4；花絲細長，為冠筒之 2 倍；花柱略長於花絲。核果球形，熟時藍黑色，基部具紅色宿存萼片。	
採 集	全年採集根、莖。	
功 效	1、根、莖具調經理帶、祛風利尿、清熱解毒之效。(邱年永等，1992) 2、根、莖具祛風利濕、散瘀消腫之效。(蕭步丹，2003)	
主 治	1、根、莖治腰肌勞損、跌打損傷、肺結核咳嗽、咯血、疔瘡癰腫等。(譚樹輝等，2005) 2、根、莖治月經不調、赤白帶下、月內風、肝病等。(邱年永等，1992) 3、根、莖治腎虧、淋病、下消、四肢無力、食慾不振等。(鄭炳全等，1979)	
毒 性	無。	
禁 忌	不詳。	

514 海州常山	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	馬鞭草科 Verbenaceae
別名	臭梧桐。	
分布	台灣低、中海拔山區之森林林緣或灌叢中，中國、印度、韓國、日本、亞洲東南部等。	
形態	落葉灌木或喬木。樹幹灰白色，具棕褐色皮孔；小枝近方形，嫩枝葉被短柔毛。單葉，對生，軟紙質；濶卵形或三角形；長8~15cm，寬5~10cm；基部濶楔形或截形，先端漸尖；全緣或具疏淺鋸齒；嫩時兩面被白色短柔毛，後漸光滑；具長柄。花兩性，複聚繖花序，頂生或腋生，鬆散；花萼略壺狀，外被短柔毛，由綠色轉為紅色，5裂；花冠高杯形，白色或淡紅色，5裂；雄蕊4，伸出花冠外；子房上位；花柱細長，伸出花冠外，略與雄蕊等長；柱頭2裂。漿果球形，熟時紫藍色，為宿存萼所包被。	
採集	全年採集根，乾品；春季、夏季採集嫩枝葉，乾品；秋季採集果實和宿存萼。	
功效	1、根具利尿、開胃、消食之效；枝葉具祛風濕、降血壓、解毒、止痛、消腫之效。。(邱年永等，1998) 2、枝葉具祛風濕、止痢、消膨、降血壓之效；果實具祛風濕、平喘之效。(江蘇新醫學院，2005)	
主治	1、根治風濕痛、骨節酸痛、高血壓、跌打損傷等。(邱年永等，1998) 2、枝葉治半身不遂、高血壓、瘧疾等。(李永春等，2001) 3、枝葉治風濕痹痛、偏頭痛、內外痔、濕疹等；果實治牙痛、氣喘、風濕痛等。(江蘇新醫學院，2005)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	

515 石莧	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene	馬鞭草科 Verbenaceae
別名	過江藤、鴨舌癩。	
分布	臺灣低海拔地區，全世界熱帶、亞熱帶地區等。	
形態	多年生匍匐草本。莖細長，長20~100cm，節上隨處生不定根，多分枝，被短粗毛。單葉，對生；倒卵形或匙形；基部楔形，先端鈍或圓；中上部邊緣銳鋸齒狀；兩面被毛，粗糙，僅中肋明顯。花兩性，直立，圓柱形，長1~2.5cm；苞片卵形或倒卵形；花萼小形，2裂；花冠粉紅色，管狀，先端2唇，5裂，擴展；	

		雄蕊 4，2 長 2 短，著生於花管中部；子房 2 室；花柱 1。果實倒卵形。
採集		夏季、秋季採集全草。
功效		全草具有祛風，清熱，消腫，解毒，調經之效。(邱年永等，1986)
主治		全草治通經、月經不調、月經痛、咽喉紅腫、單雙喉蛾、癰疽腫毒、瘋狗咬傷、牙疳、痢疾、帶狀疱疹等。(邱年永等，1986)
毒性		無。
禁忌		不詳。

516	長穗木	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl	馬鞭草科 Verbenaceae
別名		玉龍鞭。	
分布		台灣引進栽植馴化野生於低海拔山區之空曠地，原產熱帶美洲。	
形態		多年生草本。株高 30~100cm。莖直立，分枝對生，被短毛，具稜。單葉，對生，紙質；卵形或長橢圓形；長 4~8cm，寬 2~4cm；基部楔形，先端銳尖；葉緣具粗鋸齒；各級葉脈於表面凹入明顯。花兩性，穗狀花序，細長，花稀疏；花萼管狀，膜質；花冠管狀，藍色，常彎曲，5 裂；雄蕊 2；子房 2 室；花柱凸出。核果為宿存萼所包被，藏於軸內。	
採集		全年採集全草，乾品。	
功效		1、全草具清熱解毒、利水通淋之效。(林國華，197) 2、全草具通經、活血之效。(甘偉松，1981) 3、全草具利濕化瘀、清熱解毒之效。(邱年永等，1983) 4、全草具清熱解毒、利水通淋、利濕化瘀之效。(江蘇新醫學院，2005)	
主治		1、全草治肝病、耳疾、風濕、痢疾等。(甘偉松，1981) 2、全草治喉炎、癰瘡腫痛、跌打腫痛、尿路結石、風濕筋骨痛等。(林國華，1997) 3、全草治眼熱紅腫、喉炎、大瘡腫痛、跌打腫痛等。(江蘇新醫學院，2005) 4、全草治淋病、白濁、結膜炎、風濕痺痛、肝病等。(邱年永等，1983)	
毒性		不詳。	
禁忌		不詳。	

517	黃荊	<i>Vitex negundo</i> L.	馬鞭草科 Verbenaceae
-----	----	-------------------------	---------------------

別名	埔姜。
分布	台灣低海拔山區之空曠地，中國、日本、非洲東部、亞洲南部和東南部、太平洋群島等。
形態	落葉灌木或喬木。枝葉具特殊氣味，嫩枝灰白色，密被細毛。掌狀複葉，對生；小葉 3~7，通常為 5，中葉最長；長橢圓狀披針；長 4~8cm，寬 1.5~3.5cm；基部楔形或鈍形，先端漸尖尾狀；全緣；表面綠色，疏被短毛，背面色白，密被短絨毛。花兩性，圓錐花序，頂生；花萼鐘形，5 裂；花冠淡紫色，唇形，上唇 2 裂，下唇 3 裂；雄蕊 4，2 長 2 短；子房 4 室；花柱細長，與短雄蕊略等長；柱頭 2 裂。核果倒卵形，為宿存萼包被一半，熟時褐色。
採集	全年採集根；夏季採集枝葉；秋季採集果實，乾品。
功效	1、根具解表、祛風濕、理氣止痛、截瘧、驅蟲、濕經散瘀、解肌發汗之效。(江蘇新醫學院，2005) 2、枝具祛風解表、消腫解毒之效。(邱年永等，1983) 3、葉具清熱解表、利濕解毒之效。(李永春等，2001) 4、果實具養肝、利竅、堅齒、聰耳、明目、鎮咳之效。(江蘇新醫學院，2005)
主治	1、根治小兒五疳、瘡腫、牙痛等。(甘偉松，1981) 2、根治瘧疾、風濕關節痛、胃潰瘍、蟻蟲病、腰痛、慢性胃炎等；枝治關節炎、火燙傷成瘡、牙痛等；葉治感冒、中暑、嘔吐、泄瀉、痢疾、淋病等。(江蘇新醫學院，2005) 3、果實治支氣管炎、哮喘、疝氣、痔漏、腸炎等。(李永春等，2001)
毒性	不詳。
禁忌	非風邪頭痛者、胃虛者、散瞳者皆忌。(吳進錫，1981)

<b>518</b> 薄姜木	<i>Vitex quinata</i> (Lour.) F. N. Williams	馬鞭草科 Verbenaceae
別名	山埔姜。	
分布	臺灣低、中海拔山區，中國西南部及海南島、日本、印度、馬來西亞、菲律賓等。	
形態	常綠喬木。小枝近方形，被毛。掌狀複葉，對生，柄長 5~10cm；小葉 5，偶有 3 者，倒卵狀橢圓形或橢圓形，中間小葉最大，長 5~12cm，寬 2~4cm，基部楔形，先端漸尖形，全緣或疏鋸齒緣。花兩性，圓錐花序，頂生，被灰色毛；苞片線形，早落；花萼杯狀，結果時擴大如盤狀；花冠黃白色，唇形，上唇 2 裂，下	

	唇 3 裂，中間裂片最大，頂端帶紫紅色；雄蕊 4，2 強，伸出花冠外；花藥丁字形分叉；子房球形；柱頭 2 裂。核果球形或卵圓形，熟時黑色，基部具宿存萼。
採 集	全年採集根、心材、葉。
功 效	1、根、心材具清熱，鎮靜，止咳，定喘之效。(邱永等年，1992) 2、葉具祛風、清肺、止咳、行血、活血、止血、鎮靜之效。(邱年永等，1992)
主 治	1、葉治肺炎、重感冒、熱咳、支氣管炎、咳嗽、咽喉炎、寒咳、熱咳吐血、衄血、胸悶等。(邱年永等，1992) 2、根、心材治咳喘、氣促、胃病等。(邱年永等，1992)
毒 性	無。
禁 忌	不詳。

<b>519</b> 單 葉 蔓 荊	<i>Vitex rotundifolia</i> L. f.	馬鞭草科 Verbenaceae
別 名	海埔姜。	
分 布	臺灣沿海地區，中國、日本、琉球、太平洋諸島、亞洲熱帶地區等。	
形 態	落葉灌木。斜上或伏地而生，全株具有特殊香氣。嫩枝四方形，密生柔毛，老枝漸變圓，毛漸脫落。單葉，對生；卵形或倒卵形；長 2.5~5cm，寬 1.5~3cm；基部楔形至圓形，先端短尖；全緣；表面綠色，疏生短柔毛和腺點，背面白色，密生短柔毛和腺點。花兩性，圓錐花序，頂生；花萼鐘形，先端具 5 短刺，外被白色密毛；花冠淡紫色，5 裂，中間 1 裂片較大，下半部被毛；雄蕊 4，伸出花冠管外；花藥分叉；子房球形，密生腺點；柱頭 2 裂。漿果球形，被宿存萼包圍住大部分。	
採 集	秋季採集熟果，曬乾，皺淨雜質，稱蔓荊子；全年採集葉，曬乾，稱蔓荊子葉。	
功 效	果實具疏散風熱 清利頭目之效。(邱年永等，1983)	
主 治	1、果實治頭風、風寒侵目、腫痛出泪、澀脹羞明、勞役飲食不節、內障眼病等。(邱年永等，1983) 2、葉治跌打損傷、消腫止痛，風濕疼痛，刀傷止血、頭風等。(邱年永等，1983)	
毒 性	無。	
禁 忌	不詳。	

<b>520</b> 網果筋骨草	<i>Ajuga dictyocarpa</i> Hayata	唇形科 Labiatae
別名		
分布	台灣北部低海拔山區之空曠地，中國、越南、琉球等。	
形態	一年或二年生草本。全株密被毛，從基部分枝，高 10~20cm。莖直立。單葉，對生；橢圓形或菱狀卵形；長 3~6cm，寬 2~5cm；基部漸尖形，先端尖；疏粗鈍鋸齒緣；兩面被毛；葉柄長 1~4cm。花兩性，輪繖花序，頂生；花冠淡藍白色至粉紅色，唇形。果實被宿存萼包住，小堅果卵圓形，具網紋。	
採集	全年採集全草。	
功效	全草具清熱、解毒、消腫、止痛、涼血、平肝之效。(邱年永等，2001)	
主治	全草治目赤腫痛、結膜炎、牙痛、鼻衄、腮腺炎、扁桃腺炎、咽喉腫痛、氣管炎、急性膽囊炎、肺炎、肺膿瘍、肝炎、高血壓、胃腸炎、腹痛下痢、便血、脫肛、痔瘡、梅毒、血瘀腫痛、產後瘀血、婦女血氣痛、乳腺炎、腫瘤、癌症、咽喉癌、外傷出血、刀傷、火燙傷、金瘡、跌打損傷、毒蛇咬傷、狂犬咬傷、癰瘡腫毒等。(邱年永等，2001)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	

<b>521</b> 日本筋骨草	<i>Ajuga nipponensis</i> Makino	唇形科 Labiatae
別名	白毛筋骨草、日本散血草、白尾蜈蚣。	
分布	台灣低海拔山區之空曠地，中國南部及西南部、韓國、日本等。	
形態	一年或二年生草本。全株密被毛，從基部分枝，高 10~20cm。莖直立。單葉，對生；潤橢圓形或倒卵狀橢圓形；長 2.5~4.5cm，寬 1.5~3cm；基部漸尖形，先端尖；疏鈍鋸齒緣或缺刻狀波緣；柄長 1.5~3cm，具翼。花兩性，輪繖花序，頂生；花冠白色至淡紫色，唇形，上唇小，近卵形，頂端 2 裂，下唇大 3 裂，中央裂片最大。果實被宿存萼包住，卵圓狀三棱形。	
採集	全年採集全草。	
功效	全草具清熱、解毒、消腫、止痛、涼血、平肝之效。(邱年永等，2001)	
主治	全草治目赤腫痛、結膜炎、牙痛、鼻衄、腮腺炎、扁桃腺炎、咽喉腫痛、氣管炎、急性膽囊炎、肺炎、肺膿瘍、肝炎、高血	

		壓、胃腸炎、腹痛下痢、便血、脫肛、痔瘡、梅毒、血瘀腫痛、產後瘀血、乳腺炎、腫瘤、癌症、咽喉癌、外傷出血、刀傷、火燙傷、金瘡、跌打損傷、毒蛇咬傷、狂犬咬傷、癰瘡腫毒等。(邱年永等，2001)
毒	性	不詳。
禁	忌	不詳。

<b>522</b>		
矮筋骨草	<i>Ajuga pygmaea</i> A. Gray	唇形科 Labiatae
別名	金瘡小草、散血草、紅白尾蜈蚣。	
分布	臺灣低海拔山區之空地，中國大陸、韓國、日本等。	
形態	多年生匍匐草本。全株被毛。莖方形，匍匐地面，隨處分生新株。單葉，對生；根生葉放射狀，長 4~6cm，寬 1~2cm，倒披針形，先端鈍，疏鋸齒緣，綠色或帶紫色；莖上葉較小，長 1.5~3cm。兩花性，花小形，濃紫色，簇生；花萼 5 裂，被毛；花冠長約 1cm，上唇短 2 裂，下唇大 3 裂；雄蕊 4，2 長。果為 4 分果，分果卵球形。	
採集	春季、夏季採全草	
功效	全草具止咳化痰，清熱，涼血，消腫，解毒之效。	
主治	全草治喉痛、肺癆、跌打損傷、吐血、咽喉急閉、齒痛、瘋狗咬傷、膽道疾患繼發感染、慢性氣管炎等。(邱年永等，1983)	
毒性	無。	
禁忌	不詳。	

<b>523</b>		
台灣筋骨草	<i>Ajuga taiwanensis</i> Nakai ex Murata	唇形科 Labiatae
別名	有苞筋骨草、白尾蜈蚣、散血草。	
分布	臺灣低、中海拔山區，中國廣東、菲律賓、琉球等。	
形態	多年生草本。莖直立或斜升。被短毛，可與日本筋骨草之長毛區別之。葉 2 型，根生葉較大，倒披針形，莖生葉較小，匙形或倒卵形；兩面被短柔毛；波狀緣或疏鋸齒緣。花兩性，輪繖花序，腋生；花冠淡紫色或白色，上唇 2 裂，下唇 3 裂，長於上唇。小堅果橢圓形，具網紋。	
採集	全年採集全草。	
功效	全草具清熱、涼血、止血、解毒消腫之效。(邱年永等，1992)	
主治	全草治扁桃腺炎、咽喉炎、肺炎、跌打損傷、金瘡、乳癰、毒	

	蛇咬傷等。(邱年永等, 1992)
毒 性	無。
禁 忌	不詳。

524 光 風 輪	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) Kuntze	唇形科 Labiatae
別 名	塔花、剪刀草、瘦風輪。	
分 布	臺灣低、中海拔山區，中國東南部地區、印度、錫蘭、越南、印尼、馬來西亞、日本等。	
形 態	一年生草本。株高 10~30cm，莖多分枝，脆弱，被微毛。單葉，對生；卵形或卵圓形；長 1.5~3.5cm，寬 1~3cm；基部楔形或心形，先端尖或鈍形；鈍鋸齒緣；僅背面葉脈被毛，可與風輪菜之兩面均被長毛區別之。花兩性，輪繖花序，頂生，密集多數。花萼筒狀，花後基部膨大，被硬毛；花冠唇形，白色至紫紅色，上唇直伸，下唇 3 裂。	
採 集	夏季採集全草。	
功 效	全草具清熱解毒、祛風止痛、散瘀消腫、止血、止痢之效。(邱年永等, 1992)	
主 治	全草治感冒頭痛、中暑腹痛、小兒食積、痢疾、乳癰、蕁麻疹、過敏性發炎、婦人血崩、跌打損傷、腸炎、急性或慢性菌痢等。(邱年永等, 1992)	
毒 性	無。	
禁 忌	不詳。	

525 疏花風輪菜	<i>Clinopodium laxiflorum</i> (Hayata) Mori	唇形科 Labiatae
別 名	疏花塔花。	
分 布	特產台灣中、高海拔山區。	
形 態	多年生草本。莖基部匍匐分枝，直立或斜升，近方形，被毛。單葉，對生；卵形或心形；上半部直疏鋸齒緣；表面之側脈凹入明顯，背面脈上疏被短毛及腺點；具短柄，近無毛。花兩性，輪繖花序，腋生；花冠唇形，粉紅色至紫紅色，筒狀，上唇凹缺，下唇 3 裂，中裂片較大；雄蕊 4，2 強。小堅果近球形，略扁，具稜，光滑無毛。	
採 集	夏季、秋季採集全草，乾品或鮮品。	
功 效	全草具和血止血、疏風清熱、解毒消腫之效。(邱年永等, 2001)	



主治	全草治衄血、尿血、子宮出血、牙齦出血、外傷出血、咽喉疼痛、感冒頭痛、中暑腹痛、腸炎痢疾、肝炎、膽囊炎、乳腺炎、腮腺炎、急性結膜炎等。(邱年永等，2001)
毒性	無。
禁忌	不詳。

526 到手香	<i>Coleus amboinicus</i> Lour.	唇形科 Labiatae
別名	廣藿香、印度薄荷。	
分布	台灣引進栽植馴化野生低海拔地區，原產亞洲熱帶地區等。	
形態	多年生草本或亞灌木。全株密被絨毛，具濃鬱香氣。莖粗壯，直立或斜升，上部多分枝，方形。單葉，對生，厚紙質；心形、闊卵形或卵圓形；先端鈍具短尖；葉脈於表面凹入明顯，背面凸起亦明顯；鈍鋸齒緣；具長柄。花兩性，穗狀花序，頂生或腋生；花冠唇形，淡紫色、紫色或紫紅色。小堅果球形，略扁。	
採集	全年採集全株，以夏季採集者為佳，乾品或鮮品。	
功效	1、全草具芳香化濁、開胃止嘔之效。(羅獻瑞等，2003) 2、全草具行氣和胃、清熱利濕、解暑鎮吐、祛風活血之效。(邱年永等，1995) 3、全草具清肝火、散鬱結之效，亦為利尿劑。(甘偉松，1981)	
主治	1、葉治湯火傷、霍亂吐瀉等。(吳進錫，1979) 2、全草治癭瘤瘰癧、目赤腫痛、癰腫瘡毒、淋病、高血壓、淋巴腺結核等。(甘偉松，1981) 3、全草治胸悶不舒、暑濕倦怠、鼻淵頭痛等。(羅獻瑞等，2003)	
毒性	無。	
禁忌	不詳。	

527 金錢薄荷	<i>Glechoma hederacea</i> L.var. <i>grandis</i> (A.Gray) Kudo	唇形科 Labiatae
別名	金錢草、連錢草、大馬蹄草。	
分布	臺灣全境平野至中海拔濕潤地或陰濕地，韓國、日本等。	
形態	多年生匍匐草本。全株具芳香味。莖略方形，多分枝。單葉，對生；腎形或心形；長 1.5~2cm，寬 2~2.5cm；皺縮不平；兩面被毛茸，鈍鋸齒緣；柄長 2~4cm。花兩性，腋生，1~3 朵，小花梗長 4~5cm，被毛；萼筒被毛，先端 5 裂，裂片先端刺芒狀；花冠淡紫紅色，先端 2 唇裂，上唇頂端微凹，下唇 4 裂，內面	

		被深紫色斑點；雄蕊 4；柱頭 2 歧。瘦果細小，橢圓狀，稍扁，光滑。
採集		全年採集全草。
功效		全草具解熱，利尿，行血，降血壓，止痛，消腫，止痢之效。(邱年永等，1992)
主治		全草治腹痛，胃痛、腹部神經痛、胸痛、腰骨痛、閃腰、肝病、肺病、咳嗽、咳嗽失音、咳血、結石症、腦中風等。(邱年永等，1992)
毒性		無。
禁忌		不詳。

<b>528</b>		
頭花四方骨	<i>Hyptis rhomboides</i> Mart. et Gal.	唇形科 Labiatae
別名	白冇骨消、冇廣麻、頭花香苦草。	
分布	台灣低海拔山區之潮濕地，廣布世界熱帶地區。	
形態	一年生草本。全株被毛，株高 50~150cm；莖直立，方形，綠色帶紫色，分枝對生。單葉，對生，紙質；長橢圓形；長 5~12cm，寬 2~4cm；基部狹楔形，先端銳尖或漸尖；葉緣具鋸齒；兩面被短毛，背面具腺點。花兩性，頭狀花序，腋生，具長柄；花萼鐘狀，5 裂，被毛；花冠筒狀，白色，2 唇，上唇 2 裂，下唇 3 裂；雄蕊 4，略伸出花冠；子房 4 深裂；花柱細長，略長於雄蕊；柱頭 2 裂。小堅果橢圓形，平滑。	
採集	春季、秋季採集全草，乾品。	
功效	1、全草具解熱、行血之效。(甘偉松，1981) 2、全草具解熱、消腫、行血之效。(邱年永等，1986)	
主治	1、全草治感冒發熱、麻疹、大小便血等。(吳進鋈，1980) 2、全草治腹痛、痢下、肺癰、肺積水等。(高木村，1996) 3、全草治乳癰、癰瘤軟疽、淋病、腹痛下痢等。(張憲昌，1997) 4、全草治感冒、麻疹、氣喘、乳癰、腹痛等。(甘偉松，1981) 5、全草治肺病、淋疾、麻疹、中暑、各種結石等。(邱年永等，1986)	
毒性	不詳。	
禁忌	氣血具虛者慎用，勿多用。(吳進鋈，1981)	

<b>529</b>		
香苦草	<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poir.	唇形科 Labiatae

別名	狗母蘇、山粉圓、蔓苦草。
分布	台灣低海拔地區，熱帶地區等。
形態	一年生草本。莖直立，具香氣。單葉，對生；卵形；基部圓形，先端鈍；細齒緣；兩面被柔毛；具長柄。花兩性，穗狀或圓錐花序，腋生，花冠唇形，藍色。小堅果橢圓形。
採集	全年採集莖、葉。
功效	莖、葉具疏風散瘀行氣、解毒定痛、去瘀止痛、解蛇毒、止血之效。(呂通信，1996)
主治	莖、葉治皮膚炎、皮膚濕疹、毒蛇咬傷、感冒、刀傷出血、跌打腫痛、感冒頭痛、創傷出血等。(呂通信，1996)
毒性	無。
禁忌	不詳。

530 益母草	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	唇形科 Labiatae
別名	茺蔚。	
分布	臺灣低海拔地區，中國中部、韓國、日本、琉球等。	
形態	一年生或二年生草本。莖直立，方形，高 40~120cm。根生葉，卵狀心形；莖生葉 3，全裂或深裂，裂片復為羽裂，呈不整齊線形；莖先端之葉線形；背面密被白色短毛。花兩性，輪繖花序，花白色或淡粉紅色；花萼筒狀，5 淺裂，裂片刺狀；花冠唇形，上唇匙形，下唇 3 淺裂，外被長柔毛；雄蕊 4，2 長 2 短。小堅果褐色，寬楔形，具 3 稜，長約 2cm。	
採集	全年採集全草。	
功效	全草具活血、祛瘀、調經、消水之效。(邱年永等，1983)	
主治	全草治痛經、經閉、月經不順、婦人白帶、瘀血結塊、難產、胎死腹中、血尿、腎炎水腫、慢性盲腸炎、急性腎小球性腎炎等。(邱年永等，1983)	
毒性	無。	
禁忌	不詳。	

531 白花草	<i>Leucas chinensis</i> (Retz.) R. Br.	唇形科 Labiatae
別名	白花仔草、虎咬癩。	
分布	臺灣全境平野至低海拔地區，海南島及中國東南部、菲律賓、錫蘭、印度等。	

形態	多年生草本。全株被白色毛，高 30~50cm。莖近方形，基部橫伏，多分枝，上部斜升。單葉，對生；闊卵形、卵形至卵狀披針形；長 1~3cm，寬 1~1.5cm；基部鈍形或楔形，先端尖或偶鈍；疏粗鋸齒緣；兩面密被毛；具短柄。花兩性，輪繖花序，腋生；花萼筒形，密生毛茸，5 齒緣；花冠白色，唇形，上唇直立，凹入，被毛，下唇平展，3 裂，中裂片稍大；雄蕊 4；雌蕊 1；柱頭 2 裂。瘦果細小，卵狀 3 稜形，先端鈍。
採集	全年採集全草。
功效	全草具清熱、解毒、消炎、退癩之效。(邱年永等，1986)
主治	全草治痢疾、傷暑下痢、慢性盲腸炎、小便色黃。(邱年永等，1986)
毒性	無。
禁忌	不詳。

532 蜜蜂花	<i>Melissa axillaris</i> Bakh.f.	唇形科 Labiatae
別名	高山七層塔、滇荊芥。	
分布	台灣中、高海拔地區，中國中部、喜馬拉雅山、爪哇、日本等。	
形態	多年生草本。全株具芳香，被柔毛，株高 50~100cm。莖方形。單葉，對生；卵形或三角狀卵形；基部近圓形，先端尖；鋸齒緣；表面被短毛，背面常呈紫色，或僅主脈兩面紫色。花兩性，輪繖花序，腋生；花萼鐘形，外被長柔毛，上唇 3 淺裂，下唇 2 深裂；花冠白色或淡紫色，上唇直伸，端微凹，下唇 3 裂。小堅果卵形。	
採集	全年採集全草。	
功效	全草具清熱、解毒、消腫、止痛、收斂之效。(邱年永等，1995)	
主治	全草治吐血、鼻衄、風濕麻木、皮膚痛癢、瘡疹、癩症、崩漏、帶下等。(邱年永等，1995)	
毒性	無。	
禁忌	不詳。	

533 貓鬚草	<i>Orthosiphon aristatus</i> (Blume) Miq.	唇形科 Labiatae
別名	化石草。	
分布	臺灣低海拔地區，澳洲、南洋半島，印度等。	
形態	多年生亞灌木。株高 50~100cm。莖方形，基部木質化，紫褐色。	

		單葉，十字對生；卵狀披針形；長 3~10cm，寬 1~4cm；中上部葉緣具不規則鋸齒；兩面被毛，背面具腺點；柄長 1~3cm。花兩性，2~3 朵頂生枝端；花萼管狀，5 齒裂；花冠管狀纖弱，白色或淡紫色，上唇 3~4 裂，下唇全緣；雄 4，2 長 2 短；花絲細長，伸出花冠外，形如貓鬚，長 4~6cm；花柱頂端棒狀。小堅果球形，表面網紋狀。
採集		全年採集莖、枝、葉。
功效		全草具利尿、解熱、排石、消炎之效。(邱年永等，1983)
主治		全草治腎臟炎、腎結石、輸尿管結石、膀胱結石、肝炎、腎臟炎水腫、高血壓等。(邱年永等，1983)
毒性		無。
禁忌		不詳。

534 夏 枯 草	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) H. Hara	唇形科 Labiatae
別 名		
分 布	臺灣北部平地至中海海地區，世界溫帶地區等。	
形 態	多年生草本。全株被毛，株高約 30cm。莖叢生，基部匍匐，上部直立，方形，帶紅色。單葉，對生；長橢圓狀披針形；全緣或鋸齒緣。花兩性，穗狀花序，頂生；花冠淡紫或白色。小堅果褐色，長橢圓形。	
採 集	全年採集全草。	
功 效	全草具清肝、散結、解毒、利尿、降壓、抗菌、抗腫瘤、清熱、通經絡、去痰消膿、清上補下、止痛之效。(邱年永等，1983)	
主 治	全草治肝炎、肝癌、甲狀腺腫、急性扁桃腺炎、肺結核、過敏性鼻炎、白喉、小兒菌痢、腎炎水腫、血崩、高血壓、顛癇等。(邱年永等，1983)	
毒 性	無。	
禁 忌	不詳。	

535 紅花鼠尾草	<i>Salvia coccinea</i> Juss. ex Murray	唇形科 Labiatae
別 名	朱唇花。	
分 布	臺灣中海拔山區，中國南部、熱帶北美洲南部、墨西哥、印度等。	
形 態	多年生草本。株高 50~100cm，從下部分枝成叢生狀，全株被白	

	色毛。莖直立，4 稜形。單葉，對生；卵形或三角狀卵形，皺褶狀；長 3~5cm，寬 1.5~3cm；基部心形或鈍形，先端尖；鈍鋸齒緣；兩面被毛。花兩性，輪繖花序，頂生；花萼筒狀鐘形，綠色或帶紫色，外側及齒緣具白色長毛，2 唇形，上唇全緣，下唇 2 裂；花冠深紅色，長 2~2.5cm，下部長筒狀鐘形，頂端 2 唇裂，上唇先端凹入，下唇 3 裂；雄蕊 2，伸出花冠外；花柱與雄蕊等長；柱頭細頭狀。小堅果褐色，長圓形。
採集	夏季、秋季採集全草。
功效	全草具涼血、止血、清熱、發汗、利濕消腫、散結之效。(邱年永等，1992)
主治	全草治腹痛、婦女血崩、癰瘡腫毒、跌打腫痛、骨折、毒蛇咬傷等。(邱年永等，1992)
毒性	無。
禁忌	不詳。

536 半枝蓮	<i>Scutellaria barbata</i> D. Don	唇形科 Labiatae
別名	向天盞、小耳挖草、狄葉韓信草。	
分布	台灣低海拔山區之潮濕地，中國、喜馬拉雅山等。	
形態	多年生草本。株高 20~40cm。莖直立，方形，少分枝，嫩枝疏被細毛。單葉，對生，紙質；卵形至披針形；長 1~3cm，寬 0.5~1cm；基部截形或淺心形，先端鈍尖或銳尖；葉緣具疏鈍鋸齒；兩面沿脈疏被毛，背面常帶紫紅色。花兩性，總狀花序，偏向一側，頂生或腋生，每節 2 花並生；花萼鐘形，2 唇裂；花冠管狀，藍紫色，2 唇裂，上唇盔狀，凹缺，下唇較長，3 裂；雄蕊 4，2 長 2 短；子房 4 深裂；花絲細長；柱頭 2 裂。小堅果球形。	
採集	春季、夏季採集全草，鮮品或乾品。	
功效	1、全草具活血行氣、散風理咳、解熱止痛之效。(甘偉松，1981) 2、全草具清熱解毒、散瘀止血、利尿、抗癌之效。(李永春等，2001) 3、全草具清熱、解毒、散瘀、止血、鎮痛之效。(邱年永等，1983) 4、全草具祛風、行氣、利水、通絡、消腫、止痛、破血、通經之效。(江蘇新醫學院，2005)	
主治	1、全草治各種癌症、肝炎、乳腺炎、胃潰瘍出血、毒蛇咬傷、瘡癤等。(羅獻瑞等，2000) 2、全草治跌打損傷、腸炎、盲腸炎、胎毒、驚風等。(甘偉松，	

	1981) 3、全草治癰疽、疔腫、吐血、衄血、血痢、血淋、肺癌等。(李永春等, 2001) 4、全草治尿道炎、咽喉炎、扁桃腺炎、癌症、肝炎等。(邱年永等, 1983) 5、全草治痢疾、胃氣痛、食道癌、子宮癌、胃癌等。(江蘇新醫學院, 2005)
毒 性	不詳。
禁 忌	血虛者不宜, 孕婦慎服。(江蘇新醫學院, 2005)

537 耳 挖 草	<i>Scutellaria indica</i> L.	唇形科 Labiatae
別 名	印度黃芩、立浪草、韓信草。	
分 布	台灣中、北部低、中海拔地區之空曠地, 亞洲東部至西伯利亞西部等	
形 態	一年生或多年生草本。全株被毛。莖直立, 高 10~30cm, 四方形, 常帶紫色。單葉, 對生, 紙質; 潤卵形、心形或近圓形; 長 1.5~4cm, 寬 1~3.5cm; 基部鈍形至心形, 先端鈍形或圓形; 葉緣具鈍鋸齒; 兩面密被細毛; 葉柄長 1~3cm, 密被細毛。花兩性, 總狀花序, 頂生, 2 朵一束側生一邊; 花冠管狀, 紫色, 先端 2 唇形, 上唇微凹, 下唇 3 裂。小堅果卵圓形。	
採 集	全年採集全草, 鮮品或乾品。	
功 效	1、全草具祛風、活血、解毒、止痛之效。(高木村, 1996) 2、全草具清熱平肝、解毒消腫、活血散瘀、涼血止血、祛風止痛之效。(邱年永等, 1995)	
主 治	1、全草治牙痛、喉痛、癰疽、腫毒等。(張憲昌, 1997) 2、全草治勞鬱積傷、胸脇悶痛、吐血、咳血、咽喉諸症、跌打損傷等。(高木村, 1996) 3、全草治筋骨酸痛、化膿性骨髓炎、白濁、白帶、無名腫毒、蟲蛇咬傷、皮膚癢等。(邱年永等, 1995)	
毒 性	不詳。	
禁 忌	不詳。	

538 大花曼陀羅	<i>Brugmansia suaveolens</i> (Willid.) Bercht. et C. Presl	茄科 Solanaceae
別 名		

分 布	台灣引進栽植馴化野生於低海拔山區之陰濕地，原產南美洲。
形 態	常綠灌木。莖枝粗肥，灰白色，節肥大明顯。單葉，互生，紙質；長橢圓形；長 15~30cm，寬 8~15cm，基部潤楔形，歪斜，先端銳尖；全緣或皺曲狀；側脈於表面凹入，背面凸起；具長柄。花兩性，單生，下垂；花萼筒狀，長 8~10cm，先端 5 裂；花冠喇叭狀，長 25~30cm，白色，被細毛，5 裂；雄蕊 5；花絲與花冠筒連生；子房 2 室；花柱細長；柱頭 2 分叉。蒴果桃形，稀結果。
採 集	夏季採集根、葉，乾品；夏季、秋季採集花、果實，乾品。
功 效	1、根具溫中散寒、解鬱止痛之效；種子具平喘、祛風、止痛、消腫、逐瘀血、通經絡之效。(江蘇新醫學院，2005) 2、根為鎮痙藥、鎮痛藥。(甘偉松，1981) 3、葉、種子具麻醉、鎮痛、平喘、止咳之效。(邱年永等，1992) 4、花具平喘止咳、祛風、止痛、解痙之效。(羅獻瑞等，2004)
主 治	1、根治瘋犬咬傷、惡瘡、牛皮癬、筋骨疼痛等；種子治跌打損傷、瀉痢、脫肛、關節疼痛、喘咳等。(江蘇新醫學院，2005) 2、葉治喘咳、慢性支氣管炎、腳氣、疝痛、經痛、脫肛等。(邱年永等，1992) 3、花治小兒慢驚風、老人哮喘、骨酸過多、一切諸痛等。(吳進錫，1979) 4、花治風濕痹痛、腳氣、胃痛、瘡瘍痛等。(羅獻瑞等，2004)
毒 性	大毒。
禁 忌	內服宜慎，體弱者禁用。(江蘇新醫學院，2005)

539 曼 陀 羅	<i>Datura metel</i> L.	茄科 Solanaceae
別 名	白花曼陀羅、洋金花。	
分 布	台灣引進栽植馴化野生於低海拔山區，原產美洲。	
形 態	一年生草本。全株近無毛，株高 50~150cm。莖直立，基部木質化。單葉，互生，莖枝上部者近對生，紙質；卵形或卵狀橢圓形，長 10~25cm，寬 5~10cm；基部潤楔形或近圓形，歪斜，先端銳尖或漸尖；全緣、皺曲或具不規則粗鋸齒；兩面光滑無毛或疏被毛；具長柄。花兩性，單生於葉腋或枝條分叉處，直立或斜升，被白色短柔毛；花萼筒狀，長 6~9cm，5 淺裂；花冠喇叭狀，白色，長 15~20cm，5 裂；雄蕊 5，未伸出花冠筒外；子房球形，疏被短刺。蒴果球形，徑 3~3.5cm，熟時淡褐色，不規則開裂，內藏多數近腎形之種子。	
採 集	夏季採集根、葉，乾品；夏季、秋季採集花、果實，乾品。	



功效	1、根具溫中散寒、解鬱止痛之效；種子具平喘、祛風、止痛、消腫、逐瘀血、通經絡之效。(江蘇新醫學院，2005) 2、根為鎮痙藥、鎮痛藥。(甘偉松，1981) 3、葉、種子具麻醉、鎮痛、平喘、止咳之效。(邱年永等，1992) 4、花具平喘止咳、祛風、止痛、解痙之效。(羅獻瑞等，2004)
主治	1、根治瘋犬咬傷、惡瘡、牛皮癬、筋骨疼痛等；種子治跌打損傷、瀉痢、脫肛、關節疼痛、喘咳等。(江蘇新醫學院，2005) 2、葉治喘咳、慢性支氣管炎、腳氣、疝痛、經痛、脫肛等。(邱年永等，1992) 3、花治小兒慢驚風、老人哮喘、骨酸過多、一切諸痛等。(吳進鋈，1979) 4、花治風濕痹痛、腳氣、胃痛、瘡瘍痛等。(羅獻瑞等，2004)
毒性	大毒。
禁忌	內服宜慎，體弱者禁用。(江蘇新醫學院，2005)

540 雙花龍葵	<i>Lycianthes biflora</i> (Lour.) Bitter	茄科 Solanaceae
別名	紅絲線、十萼茄。	
分布	台灣低、中海拔山區之森林中，中國、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、日本、新幾內亞等。	
形態	多年生草本。全株密被柔毛，株高 50~100cm。莖直立，基部木質化，上部分枝，節明顯。單葉，枝條上部者一大一小 2 枚併生後再互生，餘者 1 枚互生；卵形、潤楔形或卵狀橢圓形；長 2~10cm，寬 2~6cm；基部潤楔形，先端漸尖；全緣；兩面被柔毛。花兩性，單生或 2~6 朵簇生於葉腋，但常 2 朵併生，略向下彎曲；花萼短潤鐘形，10 裂，裂片線形；花冠潤鐘形，白色，5 深裂；雄蕊 10，著生花冠筒上；子房上位，2 室；花柱長於花冠筒和雄蕊，伸出於外。漿果球形，徑 0.6~0.8cm，熟時紅色。	
採集	秋季、冬季採集全草，乾品。	
功效	1、全草具清熱解毒、祛痰止咳之效。(林國華，1987) 2、全草具清熱、解毒、止咳、補虛之效。(江蘇新醫學院，2005)	
主治	1、全草治火疔、狂犬咬傷等。(邱年永等，1986) 2、全草治一切腫毒疔瘡、各種血痢、血濁、血熱等。(吳進鋈，1979) 3、全草治毒蚊咬傷、外傷出血、虛勞咳嗽、久咳、消化不良、血崩、骨鯁等。(羅獻瑞等，2004) 4、全草治慢性氣管炎、支氣管哮喘等。(林國華，1987)	

毒	性	不詳。
禁	忌	本品服用後有頭暈、噁心、嘔吐等副作用，停藥後即可消失。(林國華，1987)

541	枸 杞	<i>Lycium chinense</i> Mill.	茄科 Solanaceae
別	名	地骨皮。	
分	布	台灣引進栽植馴化野生於低海拔山區之向陽地，原產中國、日本、韓國、尼泊爾、巴基斯坦、歐洲等。	
形	態	落葉灌木。株高 50~100cm。多分枝，枝條細長蔓性，嫩枝具刺，灰綠色，方形。單葉，互生或叢生於短枝上，紙質；卵形、菱形或披針形；長 2~5cm，寬 0.5~3cm；基部狹楔形，先端鈍或銳尖；全緣；兩面無毛。花兩性，單生或數朵簇生於葉腋；花萼鐘形，5 淺裂；花冠潤鐘形，紫色，5 中裂；雄蕊 5，著生於花冠筒；花絲基部被毛；花藥丁字著生；子房上位；花柱細長，略長於雄蕊。漿果橢圓形，長 1~2cm，徑 0.4~0.8cm，熟時紅色。	
採	集	春季、夏季採集根；春季、秋季採集嫩莖葉；夏季、秋季採集果實，乾品。	
功	效	1、根具涼血、去骨火、清肺熱之效。(羅獻瑞等，2004) 2、嫩莖葉具清熱、明目、涼血、祛風、補虛之效。(蕭步丹，2003) 3、嫩莖葉具補虛益精、清熱止渴、清肝明目、益腎堅精之效。(邱年永等，1998) 4、果實具滋腎、潤肺、益肝、明目、補益精氣、強盛陰道之效。(江蘇新醫學院，2005)	
主	治	1、根治肺結核潮熱、咳嗽吐血、濕火骨痛等。(羅獻瑞等，2004) 2、嫩莖葉治五勞七傷、房事衰弱、視力減退、夜盲症等。(江蘇新醫學院，2005) 3、嫩莖葉治肺熱咳嗽、熱毒瘡腫等。(蕭步丹，2003) 4、果實治肝腎陰虛、遺精、腰膝酸軟等。(李永春等，2001) 5、果實治糖尿病、肺結核等。(甘偉松，1981)	
毒	性	不詳。	
禁	忌	外邪實熱、脾虛有濕和泄瀉者忌服。(江蘇新醫學院，2005)	

542	苦 職	<i>Physalis angulata</i> L.	茄科 Solanaceae
別	名	博仔草、燈籠草。	

分 布	臺灣低海拔地區，世界熱帶至溫帶地區等。
形 態	一年生草本；株高 20~80cm。莖分枝斜升或直立，被毛或近無毛。單葉，對生；闊卵圓形或長圓形；長 3~8cm，寬 2~6cm；基部斜圓形，先端短尖或漸尖；全緣或不規則淺裂；柄長 2~5cm。花兩性，單生葉腋，梗長 4~5cm，淡黃色；花萼短筒形，先端 5 淺裂，被柔毛；花冠盃狀；雄蕊 5；子房卵形；花柱線形；柱頭不明顯。漿果球形，光滑，宿存萼在花謝後漸膨大如燈籠，徑可達 2.5cm，具 5 稜，綠色，被毛。
採 集	夏季、秋季採全草。
功 效	全草具清熱、利尿、鎮咳、行血、調經、理帶、解毒之效。(邱年永等，1986)
主 治	全草治子宮炎、卵巢炎、月經痛、赤白帶、子宮癌、毒蛇咬傷、腹痛、氣脹、腹痛兼嘔吐者、喉癢咳嗽無痰等。(邱年永等，1986)
毒 性	無。
禁 忌	不祥。

543 秘 魯 苦 職	<i>Physalis peruviana</i> L.	茄科 Solanaceae
別 名		
分 布	台灣進栽植馴化野生於中南部低、中海拔山區之林緣，原產南美洲。	
形 態	多年生草本。株高 45~90cm。莖直立，具 4 稜，多分枝，枝條斜升，密被腺毛，紫褐色。單葉，互生，偶一大一小併生，紙質；闊卵形至心形；長 6~15cm，寬 4~10cm；基部心形，先端短漸尖；葉緣具不規則粗齒；葉兩面密被腺毛；葉柄被腺毛。花兩性，單生於葉腋；花萼短鐘狀，5 裂；花冠短潤鐘形，黃色，5 裂；雄蕊 5，著生於花冠筒；子房上位，花柱與雄蕊略等長。漿果球形，徑 2~3cm，為增大宿存萼所包被，具 5 稜，被毛。	
採 集	秋季採集全草。	
功 效	1、全草具祛風止痛、解熱利尿之效。(甘偉松，1981) 2、全草具清熱解毒、利尿去濕之效。(羅獻瑞等，2000) 3、全草具清熱、行氣、止痛、消腫、利尿、消脹之效。(江蘇新醫學院，2005) 4、全草具清熱、利尿、鎮咳、行血、調經、理帶、解毒之效。(李年永等，1986)	
主 治	1、全草治咽喉腫痛、肺熱咳嗽、肺癰、腮腺炎、黃疸等。(李永春等，2001)	

		2、全草治子宮炎、卵巢炎、經痛等。(甘偉松，1981) 3、全草治癩痧發熱、咳嗽、睪丸炎、大疱瘡等。(羅獻瑞等，2000) 4、全草治疝氣、傷寒、支氣管炎、疱疹、瘡癤等。(江蘇新醫學院，2005) 5、全草治急性淋病、牙齦腫痛、百日咳、水腫、指瘡等。(邱年永等，1986)
毒	性	不詳。
禁	忌	不詳。

544		茄科
刺	茄	<i>Solanum capsicoides</i> All.
別	名	小癩茄、癩茄、臭柿仔。
分	布	台灣引進栽植馴化野生低、中海拔山區，原產巴西、溫帶至熱帶地區等。
形	態	多年生草本或亞灌木。全株具刺，刺長短不一，嫩莖、葉並混生刺毛。單葉，互生，或成對併生；潤卵形或心形，5~7中裂；表面被毛，脈上具刺，背面無毛或脈上被毛，脈上具刺；具長柄。花兩性，聚繖花序，腋外生，1至數朵；花冠輪狀，白色，中心淡黃色，5裂。漿果球形，熟時紅色，基部具宿存萼裂片。
採	集	夏季、秋季採集根、莖、葉；秋季採集果實、種子。
功	效	1、根具祛痰、鎮咳、平喘、解熱、利尿、散瘀、止痛之效。(邱年永等，1986) 2、根具清水、利尿之效。(鄭炳全等，1979) 3、全草具活血散瘀、鎮痛麻醉之效。(林國華，1987)
主	治	1、根治跌打將死、痙攣性咳嗽、哮喘、胸痛等；種子治牙痛等。(甘偉松，1981) 2、根治風濕性腰腿疼痛、胃痛、凍瘡等。(林國華，1987) 3、根治痔瘡、癰瘡腫毒、癩癧、跌打損傷等；莖、葉治小兒口腔炎等。(邱年永等，1986)
毒	性	全株具毒。
禁	忌	果實只可外用，不宜內服。(鄭炳全等，1979)

545		茄科
瑪	瑙	<i>Solanum diphyllum</i> L.
別	名	冬珊瑚、玉珊瑚。
分	布	台灣引進栽植馴化野生於低海拔地區，原產墨西哥、美洲中部

	等。
形態	常綠小灌木。全株光滑無毛。莖直立，上部多分枝，枝條略折曲。單葉，常一大一小成對併生；大葉者為橢圓形至長橢圓形，小葉者為潤橢圓形至近圓形；全緣。花兩性，單朵或數朵簇生於葉腋，或與葉對生；花冠白色，5 裂。漿果球形，著生於枝條表面，與葉片同一平面，熟時橙色。
採集	全年採集根。
功效	1、根具解毒、止痛之效。(邱年永等，1986) 2、根具解熱、利濕、消腫、消積、利膈之效。(高木村，1996)
主治	1、根治癆傷腰痛等。(甘偉松，1981) 2、葉治腫毒等。(邱年永等，1986) 3、根、莖治肝炎、風濕麻痺、濕熱癢瘡、疔瘡、月經不調等。(高木村，1996)
毒性	曾有報告小兒吞食果實 3~4 枚，而引起噁心、劇烈腹痛、瞳孔放大，而致中毒死亡。
禁忌	果實勿內服。(甘偉松等，1981)

546 毛玉珊瑚	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	茄科 Solanaceae
別名	珊瑚櫻。	
分布	台灣引進栽植馴化野生於低、中海拔山區之空曠地或林緣，原產南美巴西等。	
形態	常綠灌木。株高 50~150cm。莖灰褐色，節明顯；嫩枝綠色。單葉，通常一大一小併生後互生，紙質；長橢圓形至披針形；長 2~6cm，寬 1~2cm；基部楔形，先端鈍尖；全緣而皺曲；背面被枝狀毛。兩性花，單朵或成對，與葉對生或節上著生；花萼短鐘狀，5 裂；花冠短鐘狀，白色，5 裂；雄蕊 5；子房上位。漿果球形，熟時橘紅色或紅色，徑 1.5~2cm。	
採集	秋季採集根、全草。	
功效	1、根具止痛之效。(甘偉松，1981) 2、根、全草具解熱、利濕、消腫、消積、利膈之效。(邱年永等，1986)	
主治	1、根治癆傷腰痛等。(甘偉松，1981) 2、根、全草治肝炎、風濕麻痺、濕熱癢瘡、疔瘡、月經不調等。(邱年永等，1986)	
毒性	小毒。	
禁忌	不詳。	

547 萬 桃 花	<i>Solanum torvum</i> Sw.	茄科 Solanaceae
別 名	水茄。	
分 布	台灣低、中海拔山區，中國南部及西南部、印度、東南亞及美洲等熱帶地區。	
形 態	多年生亞灌木；株高可達 3m，全株密被星狀毛。莖直立，分枝粗壯，小枝圓柱形，綠色，具刺。單葉，互生，或成對併生；卵形或橢圓形；基部略歪斜，先端鈍，具短尖；葉緣波狀或 5~7 淺裂；兩面被星狀毛；具長柄。花兩性，總狀花序，腋外生；花冠輪狀，白色，5 裂。漿果球形，熟時黃色。	
採 集	全年採集根、葉；秋季採集果實。	
功 效	1、根具活血、散瘀、消腫之效。(邱年永等，2001) 2、根具止痛、止咳之效。(林國華，1987) 3、果實具解表溫裏、化痰止咳、消腫止痛、活血通經、截瘧之效。(羅獻瑞等，2001)	
主 治	1、根治跌打損傷、腰肌勞損、胃痛、牙痛、閉經、久咳等；葉治癰瘡腫毒等。(林國華，1987) 2、根治痧症、無名腫毒、疔瘡等。(邱年永等，2001) 3、果實治感冒、咳血、胃痛、瘧疾、疥瘡腫痛、閉經、牙痛、痧症等。(羅獻瑞等，2001)	
毒 性	本品服用過量可致中毒，會出現口乾、視線模糊，甚或狂躁、驚厥等症狀。	
禁 忌	青光眼病人忌內服，俾免增加眼壓，致病情惡化。(林國華，1987)	

548 黃 水 茄	<i>Solanum undatum</i> Lam.	茄科 Solanaceae
別 名	黃果刺茄、黃果茄。	
分 布	台灣低海拔山區之空曠地，亞洲南部等地區。	
形 態	多年生灌木狀草本。全株具刺，密被白色星狀毛。單葉，一大一小同節，互生，紙質；卵形或潤卵形；長 5~12cm，寬 4~6cm；基部心形或略歪斜，先端鈍形；葉緣深波狀或深裂；兩面脈上具刺，被星狀絨毛。花兩性，聚繖花序，側生，鬆散；花萼鐘形，5 裂，外被星狀毛，具刺；花冠鐘形，藍紫色或白色，5 裂；雄蕊 5；子房上位。漿果球形，熟時黃色，光滑，徑 2~3cm，基部宿存萼具刺。	
採 集	夏季、秋季採集根；秋季、冬季採集果實；全年採集全草，乾	

	品。
功效	1、全草、果實具鎮痛、消炎之效。(甘偉松，1981) 2、全草、根具祛風、止痛、消炎之效。(張憲昌，1997) 3、全草、根具清熱利濕、解毒止痛、化瘀消腫之效。(邱年永等，2001) 4、根、果實具清熱利濕、消瘀止痛之效。(江蘇新醫學院，2005)
主治	1、全草、果實治急性或慢性肝炎、鼻竇炎、皮膚癢、黃疸、濕性胸膜炎及水腫等。(高木村，1996) 2、全草、根治肝炎、肝硬化、淋巴腺炎、瘡癤等。(張憲昌，1997) 3、根治痔瘡，全草治心臟病等。(邱年永等，2001) 4、根治睪丸炎、牙痛、風濕性關節炎、手足麻痺等；果實治頭瘡等。(江蘇新醫學院，2005)
毒性	不詳。
禁忌	不詳。

549 印度茄	<i>Solanum violaceum</i> Ortega	茄科 Solanaceae
別名	刺天茄、鈕仔茄、五宅茄。	
分布	台灣低海拔地區，中國南部及西南部、亞洲熱帶地區等。	
形態	多年生亞灌木。高可達 2m，全株密被具柄之星狀毛，並疏生皮刺。莖直立，基部木質化，上部多分枝，小枝圓柱形，褐色，嫩枝綠色。單葉，互生，或一大一小成對併生；卵形至潤披針形；兩面脈生疏生皮刺；先端鈍，具短尖。花兩性，總狀花序，腋外生；花冠輪狀，藍紫色，5 裂。漿果球形，熟時橙紅色。	
採集	全年採集全草；秋季採集果實。	
功效	1、根具清熱除濕、祛瘀消腫之效。(邱年永等，1986) 2、全草具消炎、止痛之效。(羅獻瑞等，2001) 3、果實具祛風、止痛、消腫之效。(邱年永等，1986) 4、根、莖具疏筋活絡之效。(高木村，1996)	
主治	1、根治感冒風熱、胃痛、眼翳、無名腫痛等。(高木村，1996) 2、根治花柳病、風濕關節痛、癩癧等。(邱年永等，1986) 3、葉治乳癌潰瘍等。(邱年永等，1986) 4、全草治扁桃腺炎、咽喉炎、淋巴腺炎、跌打損傷、瘡疾等。(羅獻瑞等，2001)	
毒性	無。	
禁忌	不詳。	

550		<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. et Sav.) Makino	茄科 Solanaceae
龍珠	別名		
分	布	臺灣低海拔山區，中國、日本等。	
形	態	多年生草本；株高 60~100cm。莖分枝，綠色。單葉，對生；長橢圓形；長 5~20cm，寬 3~10cm；兩端銳尖；全緣或微波緣。花兩性，2~5 朵簇生，下垂，長 1.5~2.5cm；花冠淡黃色，5 裂，裂片披針狀三角形，截頭，反卷；雄蕊 5；雌蕊 1；花柱較花絲短；柱頭頭狀。漿果呈球形，熟時紅色。	
採	集	夏季、秋季採集全草。	
功	效	1、全草為強壯劑。(甘偉松，1981) 2、幼苗具解熱毒、調中解煩、令人皮膚變白之效。(吳進錫，1979)	
主	治	1、全草治痢疾、小便淋痛、疔瘡腫毒等。(邱年永等，1983) 2、根治身體虛弱等。(吳進錫，1979) 3、幼苗治中暑熱毒等。(吳進錫，1979) 4、果實治腫瘡等。(吳進錫，1979)	
毒	性	無。	
禁	忌	虛寒者勿多食。(吳進錫，1979)	

551		<i>Bacopa monnieri</i> (L.) Wettst.	玄參科 Scrophulariaceae
過長沙	別名	假馬齒莧、白花豬母乳。	
分	布	台灣低海拔溼地，中國南部、熱帶至亞熱帶地區等。	
形	態	一年生草本，全株光滑無毛，略肉質。莖 2 型，匍匐莖節之背面生根，表面長出對生之挺空地上莖。單葉，對生；匙形至倒卵形；基部略抱莖，先端圓鈍；兩面光滑無毛；全緣；無柄。花兩性，單朵或偶成對，腋生；萼片 5，大小不一；花冠鐘形，白色或淡藍紫色，先端 5 裂，上方 2 裂片較小，下方 3 裂片較大。蒴果卵狀錐形，為宿存萼所包被。	
採	集	全年採集全草，乾品或鮮品。	
功	效	全草具清熱涼血、解毒消腫之效。(邱年永等，1995)	
主	治	全草治糖尿病、痢疾、丹毒、腫毒、痔瘡腫痛、目赤腫痛、象皮腫等。(邱年永等，1995)	
毒	性	無。	
禁	忌	不詳。	



552 毛地黃	<i>Digitalis purpurea</i> L.	玄參科 Scrophulariaceae
別名	洋地黃、毒藥草。	
分布	台灣引進栽植馴化野生於中海拔山區之空曠地，原產歐洲等地區。	
形態	多年生草本。全株被絨毛。莖直立，單一不分叉，株高 100~150cm。基生葉叢生，卵形至卵狀長橢圓形，長 12~25cm，寬 3~12cm；越往莖頂越縮小，互生；基部楔形，先端漸尖；葉緣具鈍鋸齒；各級葉脈於葉面凹入，於葉背凸起；兩面被絨毛。花兩性，總狀花序，頂生，10 數朵花排列於單邊；花冠長鐘形，近 2 唇形，紫色或白色，花筒內具斑點和條紋。蒴果卵形，長 0.8~1.2cm，寬 0.6~0.9cm，為宿存花萼所包被。	
採集	春季至秋季採集葉片，乾品。	
功效	葉為強心利尿藥。(甘偉松，1971)	
主治	葉治心臟衰弱症、心臟瓣膜症、心臟性水腫、心肌炎、心囊炎等。(邱年永等，1983)	
毒性	具劇毒。	
禁忌	謹慎注意用量。(邱年永等，1983)	

553 異葉紅珠	<i>Hemiphragma heterophyllum</i> Wall.	玄參科 Scrophulariaceae
別名	腰只花、羊膜草、鞭打繡球。	
分布	台灣中、高海拔山區之林緣或空曠地，中國雲南和貴州、孟買、喜馬拉雅山東部等。	
形態	多年生匍匐草本。全株被毛。莖下部較纖細，上部較粗，密被絨毛。葉 2 型：春季和夏季之葉較潤，著生主莖對生；潤卵狀心形；長 0.5~1.5cm，寬 0.5~1.5cm；基部心形，先端銳形；鈍鋸齒緣；兩面疏被白色柔毛；具短柄。秋季和冬季之葉針狀，著生於側枝，叢生後再對生。花兩性，單生於針狀葉之葉腋；花萼鐘形，5 深裂，外被柔毛；花冠筒狀，粉紅色，5 淺裂；雄蕊 4，著生花冠筒，離生，未伸出花冠口；子房上位；柱頭 2 裂。蒴果球形，徑 0.6~0.8cm，熟時深紅色，胞間開裂，基部具宿存萼。	
採集	夏季、秋季採集全草，乾品。	
功效	1、葉具止血之效。(甘偉松，1981) 2、全草具益氣止痛、去瘀止血，舒筋活血、除濕祛風之效。(邱	

	年永等，1986) 3、全草具強壯滋補、止血祛痰、理氣止痛之效。(江蘇新醫學院，2005)
主治	1、全草治腸炎、痢下、肝實火等。(吳進錫，1981) 2、全草治咳血、經閉、月經不調、跌打損傷、破傷風、神經衰弱、瘡腫濕毒等。(江蘇新醫學院，2005) 3、全草治風濕腰痛、淋巴結核、砂淋、瘡瘍、黃水瘡、口腔炎等。(邱年永等，1986)
毒性	小毒。
禁忌	不宜過量服用。(吳進錫，1981)

554 定經草	<i>Lindernia anagallis</i> (Burm. f.) Pennell	玄參科 Scrophulariaceae
別名	心葉母草。	
分布	台灣低海拔地區，中國北部、中南半島、印度、孟買、馬來西亞等。	
形態	一年生草本。莖下部伏地，花莖上舉。單葉，對生；卵形；基部心形，先端短尖或鈍；鋸齒緣；柄短。花兩性，單生於葉腋，柄長；花冠白色或淡紫色。蒴果圓柱形。	
採集	全年採集全草。	
功效	全草具清熱消腫、利尿通淋、行血祛瘀、生血補陰、理腎固精之效。(呂通信，1996)	
主治	全草治風火眼、風毒流注、遺精、白濁、白帶、肺炎、月經不調、小兒腹瀉等。(呂通信，1996)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	

555 泥花草	<i>Lindernia antipoda</i> (L.) Alston	玄參科 Scrophulariaceae
別名	蟹筍草。	
分布	台灣低海拔地區之濕地，中國南部及中部、中南半島、日本、馬來西亞、澳洲等。	
形態	一年生草本。莖 2 型，匍匐莖節之背面生根，表面長出挺空地上莖，直立，常於基部分 2 叉而斜升，形似蟹筍。單葉，對生；橢圓狀披針形或倒卵狀長橢圓形；羽狀脈；基部略抱莖，先端鈍；疏鈍鋸齒緣。花兩性，單朵，腋生，或總狀花序，頂生，	

		花梗與鄰近之葉略等長；花冠淡紫色，上唇完整或 2 裂，下唇 3 裂。蒴果線狀披針形，為宿存萼片 2~5 倍長。
採集		夏季、秋季採集全草，乾品或鮮品。
功效		1、全草具清熱解毒之效。(林國華，1987) 2、全草具逐瘀、消腫之效。(蕭步丹，2003)
主治		1、全草治癰疽疔腫、跌打損傷、蛇蟲咬傷等。(蕭步丹，2003) 2、全草治咽喉炎、扁桃腺炎、急性胃腸炎、肺熱咳嗽等。(林國華，1987)
毒性		無。
禁忌		不詳。

556			玄參科
藍豬耳	<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F. Muell.		Scrophulariaceae
別名	母草。		
分布	臺灣低海拔山區，中國南部、印度、馬來西亞、琉球、朝鮮及日本等。		
形態	一年生草本。株高 6~18cm，多分枝，披散，無毛或被疏毛。莖方形，帶紫色。單葉，對生；卵形或心形；長 1~2cm，寬 0.5~1cm；基部闊楔形或鈍形，先端略鈍形或短尖形；疏鋸齒緣。花兩性，腋生，單生或成對，梗長 1~3cm；花萼鐘形，綠色或淡紫色，膜質，5 裂，裂片短尖形；花冠圓筒狀，淡紫色至紫色，上唇 2 裂，下唇 3 裂；雄蕊 4，2 強，著生於花筒喉部；子房上位，卵形；柱頭 2 歧。蒴果長橢圓形或卵形；種子縱橫排列整齊。		
採集	夏季、秋季採集全草。		
功效	全草具清熱利濕、解毒消腫、理帶調經之效。(邱年永等，1992)		
主治	全草治感冒、肝炎、腎炎水腫、腸炎腹瀉、白帶、月經不調、毒蛇咬傷、急性瀉痢或伴發熱、急慢性細菌性痢疾、慢性菌痢、慢性腎炎、瘡腫等。(邱年永等，1992)		
毒性	無。		
禁忌	不詳。		

557			玄參科
通泉草	<i>Mazus pumilus</i> (Burm. f.) Steenis		Scrophulariaceae
別名	六角定經草。		
分布	台灣低、中海拔山區，中國、印度、馬來西亞和日本等。		
形態	一年或二年生草本。全株光滑或略有毛茸。莖基分枝，匍匐或		

		直立。根生葉叢生，莖生葉對生，甚小，前者葉柄呈翼狀，後者近無柄；倒卵形；基部漸窄，先端半圓形；葉緣具粗鋸齒或深裂。花兩性，總狀花序，頂生；花冠唇形，藍紫色或極淺的紫色，上唇約為下唇的 1/2，前者 2 裂，後者 3 裂，在冠喉處具 2 列黃色毛狀鱗片；雄蕊 4；柱頭 2 叉狀。蒴果球形，包藏在宿存萼中。
採	集	全年採集全草。
功	效	全草具行血調經、消食健胃、止痛解毒、消炎止血之效。(邱年永等，2001)
主	治	全草治婦女閉經、月經不調、血崩漏血、高血壓、咳血、貧血、瘀血、消化不良、胃痛、偏頭痛、身體虛弱、蛇蟲咬傷、膿疱瘡、燙傷、跌打內外傷、肺炎、肝炎、胃火口舌爛痛、腎火尿黃等。(邱年永等，2001)
毒	性	無。
禁	忌	體寒或血寒閉經者勿多服；子宮虛寒者勿服鮮品，宜以酒製服用。(邱年永等，2001)

558		
台灣泡桐	<i>Paulownia taiwaniana</i> T. W. Hu et H. J. Chang	玄參科 Scrophulariaceae
別名	梧桐。	
分布	特產台灣中部低、中海拔山區之潤葉樹林中。	
形態	落葉喬木。樹皮灰褐色，具皮孔；枝條近光滑無毛。單葉，對生，紙質；闊卵形或心形；長 15~30cm，寬 10~30cm；基部心形，先端銳尖或漸尖；全緣或稀 3~5 淺裂；表面疏被腺毛，背面被絨毛；葉柄長 10~18cm。花兩性，圓錐花序，頂生，小聚繖花序具 3~5 朵，具梗；花萼鐘形，5 深裂；花冠筒狀，淡紫色，喉部黃色帶深紫色斑點，5 裂；雄蕊 4，2 長 2 短；子房上位，2 室；花柱細長。蒴果卵球形，長 3~4.5cm，熟時 2 瓣開裂。	
採集	全年採集根、木材、樹枝、樹皮，乾品；春季採集花，乾品；春季、夏季採集葉片，乾品；秋季採集果實，乾品。	
功效	1、根具消腫毒、祛風濕、清腸胃熱毒之效；樹皮具主五痔、殺三蟲之效；葉具消腫毒、生髮之效。(江蘇新醫學院，2005) 2、果實具止咳、祛痰、平喘之效。(羅獻瑞等，2000)	
主治	1、根治風濕腳痛、筋骨疼痛等；葉治無名腫毒、白喉、髮禿等；花治腮腺炎、急性扁桃腺炎、急性腸炎、急性結膜炎等。(江蘇新醫學院，2005) 2、樹皮治痔瘡、淋病、丹毒、跌打損傷等。(蕭步丹，2003)	

	3、木材治腫從腳起，稍上進者。(邱年永等，1983) 4、果實治慢性支氣管炎，咳喘痰多等。(羅獻瑞等，2000) 5、種子治傷寒發狂等。(甘偉松，1981)
毒 性	不詳。
禁 忌	不詳。

<b>559</b> 野 甘 草	<i>Scoparia dulcis</i> L.	玄參科 Scrophulariaceae
別 名	甜珠草、冰糖草。	
分 布	台灣平地至低海拔山區之田野和潮濕地，廣布全球各地區。	
形 態	一年生草本。株高 30~80cm；全株光滑無毛；莖直立，具 3 稜，基部木質化，多分枝。單葉，對生或輪生，膜質；長橢圓形；長 1~2.5cm，寬 0.3~1.5cm；基部楔形下延成柄，先端銳尖；葉緣具鋸齒；表面光滑無毛，背面具腺體。花兩性，單生或成對，腋生；花萼 4 深裂，反捲；花冠輻射狀，白色或淡紫色，花冠口被毛；雄蕊 4，離生；子房上位；花柱細長，略與雄蕊等長。蒴果卵形至球形，徑 0.2~0.3cm，熟時開裂。	
採 集	全年採集全草，鮮品或乾品。	
功 效	1、全草具涼血、退熱之效。(甘偉松，1981) 2、全草具清熱解毒、利尿消腫之效。(高木村，1996)	
主 治	1、全草治肝炎、黃疸、吐血等。(吳進錫，1979) 2、全草治咽喉炎、丹毒、肺炎、高血壓等。(邱年永等，1983) 3、全草治肺病、血熱、眼炎、吐血等。(甘偉松，1981) 4、全草治淋病、痢疾、跌打損傷、腸炎、小便不利等。(高木村，1996) 5、全草治腳氣浮腫、濕疹、熱痱、肺熱咳嗽、小兒外感發熱等。(江蘇新醫學院，2005)	
毒 性	不詳。	
禁 忌	不詳。	

<b>560</b> 釘 地 蜈 蚣	<i>Torenia concolor</i> Lindl.	玄參科 Scrophulariaceae
別 名	倒地蜈蚣。	
分 布	台灣低、中海拔山區，中國南部，向南延伸至印度等地區。	
形 態	一年或二年生草本。莖纖細，方形，具 4 稜，匍匐，多分枝，節下生根。單葉，對生；卵形或心形；粗鋸齒緣；先端銳形；	

	中肋顯著，側脈 3 對。花兩性，單生，腋生或頂生，花梗較葉長；花萼筒狀，具 5 縱稜；花冠唇形，上唇 2 淺裂，下唇 3 裂，常半開，藍紫色。蒴果長橢圓形，熟時裂開。
採集	全年採集全草。
功效	全草具消炎解毒、消腫退廣、利尿解熱之效。(李勉民，1994)
主治	全草治受熱中暑、火燙傷、口腔炎、高血壓、流鼻血、肺炎、腸胃炎、痢疾、皮膚病、皮蛇瘡疽、筋骨痛、各種腫瘡、傷風感冒、關節炎、肌腱炎、肝炎等。(李勉民，1994)
毒性	無。
禁忌	虛寒無火及胃寒者慎用。(李勉民，1994)

561 腹水草	<i>Veronicastrum axillare</i> (Sieb. et Zucc.) Yamaz.	玄參科 Scrophulariaceae
別名	釣魚竿。	
分布	台灣北部低海拔、嘉義中海拔山區之陰濕地，中國等。	
形態	多年生草本。莖圓筒形，纖細，平臥；分枝下垂。單葉，互生，紙質；橢圓形至卵形；長 3~10cm，寬 2~5cm；基部潤楔形或圓形，先端銳尖或漸尖；葉緣具銳鋸齒；兩面光滑無毛；葉柄長 0.3~1cm。花兩性，穗狀圓筒形，腋生，花多數，密集；花萼筒狀，5 深裂；花冠筒狀，紫紅色，先端 4 裂；雄蕊 2，伸出花冠外；雌蕊由 2 心皮組成；子房上位；花柱細長，略長於雄蕊。蒴果卵形，徑約 0.3cm。	
採集	全年採集全草乾品。	
功效	1、全草具行水、散瘀、解毒之效。(李永春等，2001) 2、全草具清熱、利水、行氣、去瘀、消腫、解毒之效。(邱年永等，1993) 3、全草具散風火、利濕熱、通經活血、破瘀生新、舒筋消腫、解毒之效。(江蘇新醫學院，2005)	
主治	1、全草治腹水、水腫、小便不利、黃疸型肝炎、月經不調等。(李永春等，2001) 2、全草治肺熱咳嗽、目赤、淋病、疔瘡腫毒、癰癤等。(邱年永等，1993) 3、全草治白濁、子宮脫垂、跌打損傷、毒蛇咬傷、子宮癌、便秘等。(江蘇新醫學院，2005)	
毒性	小毒。	
禁忌	不詳。	

562 山 菜 豆	<i>Radermachia sinica</i> (Hance) Hemsl.	紫葳科 Bignoniaceae
別 名	菜豆樹。	
分 布	台灣低海拔山區之森林中，中國南部等。	
形 態	落葉喬木。2 回羽狀復葉，對生；小葉對生；卵形或橢圓形；長 3~8cm，寬 2~4cm；基部楔形，先端漸尖尾狀；全緣；兩面綠色，光滑無毛。花兩性，圓錐花序，頂生；花萼筒狀，5 淺裂；花冠長筒狀，白色，長 12~14cm，5 裂，平展或反捲；雄蕊 4，2 長 2 短；花盤杯狀；子房 2 室。蒴果長圓柱狀，扭曲，長 30~60cm，下垂，熟時 2 縱裂。	
採 集	全年採集根；夏季、秋季採集葉片；秋季採集果實，乾品。	
功 效	1、根、葉、果實具涼血、解毒、消腫、止痛、接骨之效。(邱年永等，1998) 2、根、葉、果實具清熱、解毒、散瘀、止痛、消腫、涼血之效。(江蘇新醫學院，2005)	
主 治	1、根治跌打損傷等。(江蘇新醫學院，2005) 2、葉、果實治毒蛇咬傷等。(江蘇新醫學院，2005) 3、葉治傷暑發熱、癰腫等。(邱年永等，1998) 4、根、葉、果實治胃痛、高熱頭痛、骨折、扭挫傷、癰癤等。(江蘇新醫學院，2005)	
毒 性	不詳。	
禁 忌	不詳。	

563 尼 氏 擬 馬 借 花	<i>Asystasiella neesiana</i> (Nees) Lindau	爵床科 Acanthaceae
別 名	玉龍盤、擬馬借花。	
分 布	台灣中部低海拔之陰濕地，中國中南部、印度、越南、緬甸等。	
形 態	一年生或多年生草本。株高 30~80cm，全株光滑無毛。地下莖白色，富黏液；莖方形，綠色。單葉，對生，膜質；長橢圓形、披針形或闊橢圓形；長 10~18cm，寬 2~5cm；基部楔形，下延至葉柄，先端漸尖；葉緣具密細鋸齒；兩面疏被毛，表面側脈凹入；著生枝下部者具柄，上部者近無柄。花兩性，總狀花序，頂生，被紅紫色腺毛；具小苞片，披針形；花萼筒狀，5 深裂，被腺毛；花冠高杯狀，紅紫色，下部管狀細長，先端 5 淺裂；雄蕊 4，2 長 2 短；子房 2 室；花柱細長。蒴果棍棒狀，內藏種	

	子 4。
採 集	夏季、秋季採集全草，鮮品或乾品。
功 效	全草具清熱解毒、化瘀活血、止血接骨、利尿消腫之效。(邱年永等，1998)
主 治	1、根、莖治咽喉腫痛、肺結核、腹水、扭傷等。(邱年永等，1998) 2、全草治糖尿病、上消化道出血、創傷出血、外傷出血、斷指再植、癰腫、下肢潰瘍等。(邱年永等，1998)
毒 性	不詳。
禁 忌	不詳。

<b>564</b> 華九頭獅子草	<i>Dicliptera chinensis</i> (L.) Juss.	爵床科 Acanthaceae
別 名	狗肝菜。	
分 布	台灣低海拔地區，中國南部等。	
形 態	多年生草本。莖直立，具稜，節膨大。單葉，對生；卵形；基部楔形，先端銳尖；全緣；具長柄。花兩性，細小，粉紅色，聚繖花序，腋生；花冠唇形。蒴果短柱形。	
採 集	全年採集全草。	
功 效	全草具清熱解毒、涼血止血、利尿止痢、平肝明目等之效。(邱年永等，1998)	
主 治	全草治目赤腫痛、咽喉腫痛、帶狀疱疹、小便淋瀝、感冒發熱、流行性乙型腦炎、痢疾、肺熱咳嗽、咯血、喉炎、急性扁桃體炎、狂犬咬傷、毒蛇咬傷、斑疹、衄血、尿血等。(邱年永等，1998)	
毒 性	無。	
禁 忌	不詳。	

<b>565</b> 六角英	<i>Hypoestes purpurea</i> R. Br.	爵床科 Acanthaceae
別 名	紅絲線。	
分 布	台灣中部和南部低海拔山區之空曠地，中國西南部、菲律賓等。	
形 態	多年生草本。株高 50~120cm，灌木狀；莖綠色，略方形，光滑無毛，節膨大，上部多分枝。單葉，對生，膜質；卵形至卵狀披針形；長 3~12cm，寬 2~5cm，大小頗富變化；基部楔形，先端銳尖至漸尖；全緣或皺曲；兩面近無毛。花兩性，穗狀花序，頂生或腋生，排列鬆散；苞片合生；花萼鐘形，5 深裂，被細毛；	



		花冠紫紅色，上唇 2 深裂，下唇 3 裂，被腺毛，花管扭轉；雄蕊 2；子房上位；花柱細長，長於雄蕊；柱頭 2 叉。蒴果長卵形，長 0.6~1cm，光滑無毛。
採集		全年採集全草，鮮品或乾品。
功效		全草具散瘀消炎、止痛消腫、止血生肌、解熱祛痰之效。(邱年永等，1998)
主治		1、葉治腦膜炎、齒漏、眼疾、胸痛、腹痛、慢性肝炎、腳生腫毒、蛇瘡等。(邱年永等，1998) 2、枝、葉治創傷、骨折、打傷等。(邱年永等，1998) 3、全草治赤眼腫痛、咽喉疼痛、肝炎、支氣管炎、咳嗽、肺結核咳血、刀槍創傷出血等。(邱年永等，1998)
毒性		不詳。
禁忌		不詳。

566		
爵床	<i>Justicia procumbens</i> L.	爵床科 Acanthaceae
別名	鼠尾癩。	
分布	臺灣低、中海拔山區，中國南部、印度、中南半島、澳洲、菲律賓、琉球、日本等。	
形態	多年生草本。莖直立或斜升，方形或 4~6 稜，綠色，被灰白色毛，基部節曲折，稍膨大。單葉，對生；卵形或卵狀披針形至闊披針形；長 1~4cm，寬 0.5~2cm；基部楔形或鈍圓形，先端銳尖；全緣；表面暗綠色，背面淡綠色或淡紫色，兩面疏被短毛或幾近無毛。花兩性，穗狀花序，頂生或腋生，長 1~3cm，花小，淡紫紅色或乳白色；花冠唇形，上唇 2 淺裂，下唇 3 裂；雄蕊 2，生於花筒部，基部被絨毛；藥 2 室，1 室不孕而呈距狀下垂；雌蕊 1；子房卵形，2 室；花柱絲狀；柱頭頭狀。蒴果線形，先端短尖，全體呈壓扁狀，淡棕色，被白色柔毛。	
採集	夏季、秋季採集全草。	
功效	全草具清熱解毒、利濕消滯、活血止痛、消瘀、止咳嗽之效。(邱年永等，1986)	
主治	全草治感冒發熱、咳嗽、喉痛、黃疸、腰背痛、筋骨痛、風濕頭痛、小兒疳積、赤目腫痛、痢疾、跌打損傷等。(邱年永，1986)	
毒性	無。	
禁忌	不詳。	

<b>567</b> 九頭獅子草	<i>Peristrophe japonica</i> (Thunb.) Bremek.	爵床科 Acanthaceae
別名	肺癆草。	
分布	台灣低、中海拔山區，中國南部、日本等。	
形態	多年生草本。株高 30~50cm。莖具 4 稜，節膨大。單葉，對生；披針形；基部漸狹，先端銳尖；全緣；具短柄。花兩性，腋生，多數集成聚繖花序；葉狀苞 2；花萼 5 裂；花冠唇形，淡紫色，上唇 2 裂。蒴果熟時 2 裂；種子堅硬，褐色，扁圓形。	
採集	全年採集全草。	
功效	全草具祛風、清熱、化痰、解毒、發汗解表、消腫。(呂通信，1996)	
主治	全草治小兒驚風、喉痛、乳癰、氣喘、吐血、白喉、小兒發育不良、癰疽腫毒、跌傷、肺熱咳嗽、肺炎、虛弱咳嗽、男子尿結、痔瘡、毒蛇咬傷、白帶、經漏等。 (呂通信，1996)	
毒性	無。	
禁忌	孕婦忌服。胃腸虛寒者不宜多服。(呂通信，1996)	

<b>568</b> 長花九頭獅子草	<i>Peristrophe roxburghiana</i> (Schult.) Bremek.	爵床科 Acanthaceae
別名	山藍。	
分布	台灣中部和南部低、中海拔之森林中，中國中南部、印度、東部、菲律賓、馬來西亞、爪哇等。	
形態	多年生草本。株高 30~50cm。莖直立，略方形，近光滑無毛，節膨大。單葉，對生，紙質；橢圓形、卵形或卵狀橢圓形；長 2~6cm，寬 1~3cm；基部鈍形或圓形，先端銳尖至漸尖；全緣或淺波狀；兩面光滑或僅背面脈上略被毛。花兩性，聚繖花序，頂生或腋生，具苞片；花萼筒狀，5 深裂，被短毛；花冠長筒狀，紫紅色，先端 2 唇裂，下唇大於上唇；雄蕊 2；花絲被毛；花藥 1 高 1 低；子房上位；花柱細長，略短於雄蕊或等長；柱頭 2 叉。蒴果棍棒狀，長 1.5~2cm。	
採集	全年採集全草，鮮品或乾品。	
功效	全草具清肝止咳、涼血止血、消腫止痛之效。(邱年永等，1998)	
主治	1、葉治頭痛、腹痛、腫毒、疔疽等。(吳進錫，1980) 2、枝、葉治高血壓、腫毒等。(吳進錫，1980)	

	3、全草治吐血、急性氣管炎、肺炎、糖尿病、跌打損傷等。(邱年永等，1998)
毒 性	不詳。
禁 忌	胃寒者勿多服。(吳進錫，1980)

569	<i>Strobilanthes cusia</i> (Ness) Kuntze	爵床科 Acanthaceae
馬 藍	大青、南板藍。	
別 名	台灣北部和中部低海拔山區之陰濕地，中國南部和西南部、越南、印度等。	
分 布	多年生草本。株高 50~100cm。莖基部略木質化，節膨大，嫩時被短毛。單葉，對生，紙質；倒卵形、卵形或長橢圓形；長 10~16cm，寬 3~6cm；基部狹楔形，先端銳尖或鈍形具短漸尖；葉緣具鋸齒；嫩時表面疏被短毛，背面脈上被毛。花兩性，聚繖花序或穗狀花序，頂生或腋生；花萼鐘狀，5 深裂，被毛；花冠筒狀，淡紫色，5 淺裂；雄蕊 4，2 長 2 短，基部合生；子房上位；花柱細長。蒴果長橢圓形，長約 2.5cm，熟時 2 瓣開裂，內含種子 4。	
形 態	全年採集全草，鮮品或乾品。	
採 集	1、根具清熱解毒、涼血利咽之效。(羅獻瑞等，2000) 2、根具清熱、解毒、涼血、止血、辟疫、殺蟲等。(江蘇新醫學院，2005) 3、全草具清熱、解毒、涼血、止血、消腫、止痛之效。(邱年永等，1998)	
功 效	1、根治熱病發癍、丹毒、吐血等。(甘偉松，1981) 2、根治急性肝炎、流行性乙型腦炎等。(林國華，1987) 3、根治流行性感冒、流行性腮腺炎、肝炎、肝硬化、痘疹等。(江蘇新醫學院，2005) 4、根治咽喉疼痛、疔瘡、丹毒、肝炎等。(羅獻瑞等，2000) 5、鮮葉治跌打瘀血、疔瘡、血淋、小便尿血、喉痹等。(邱年永等，1998)	
主 治	不詳。	
毒 性	體虛而無實火熱毒者忌服。(江蘇新醫學院，2005)	
禁 忌		

<b>570</b> 曲莖馬藍	<i>Strobilanthes flexicaulis</i> Hayata	爵床科 Acanthaceae
別名	曲莖山藍。	
分布	特產台灣低、中海拔山區之陰濕地。	
形態	多年生灌木狀草本。株高 50~150cm。莖具縱稜和狹翅，節膨大，節間長，呈「Z」字型。單葉，對生，膜質；長橢圓形或卵形，枝上部者和下部者不同型；長 8~18cm，寬 3~6cm，枝上部者小於下部者；基部狹楔形或圓形，先端銳尖或漸尖尾狀；葉緣具鋸齒。花兩性，聚繖花序，頂生或腋生，具苞片和小苞片；花萼鐘形，5 深裂；花冠筒狀，藍紫色至白色，略彎，5 淺裂；雄蕊 4，2 長 2 短，基部合生；子房上位；花柱細長；柱頭彎曲。蒴果匙狀圓柱形，長約 2cm，熟時 2 瓣開裂，內藏種子 4。	
採集	全年採集全草，鮮品或乾品。	
功效	全草具清熱、解毒、消腫、止痛之效。(邱年永等，1998)	
主治	全草治風熱感冒、口腔炎、咽喉腫爛、乙型腦炎、腮腺炎、肝炎等。(邱年永等，1998)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	

<b>571</b> 台灣馬藍	<i>Strobilanthes formosanus</i> Moore	爵床科 Acanthaceae
別名		
分布	特產台灣北部和中部低、中海拔山區之陰濕地。	
形態	多年生灌木狀草本。株高 50~80cm。莖直立，四方形，密被毛，節略膨大。單葉，對生，膜質；長橢圓形；長 6~15cm，寬 3~5cm；基部狹楔形，先端銳尖或漸尖；葉緣具細鋸齒；兩面被毛。花兩性，聚繖花序，頂生或腋生，具苞片和小苞片；花萼鐘形，5 深裂，被毛；花冠筒狀，藍紫色至白色，略彎，5 淺裂；雄蕊 4，2 長 2 短；花絲被毛；子房上位；花柱細長，略長於雄蕊；柱頭彎曲，2 裂。蒴果匙狀圓柱形，長約 2cm，熟時 2 瓣開裂，內藏種子 4。	
採集	全年採集全草，乾品。	
功效	全草具清熱、解毒、行血、散瘀之效。(邱年永等，1998)	
主治	全草治感冒發熱、腮腺炎、咽喉疼痛、肝炎、瘡癤、跌打損傷等。(邱年永等，1998)	
毒性	不詳。	

禁忌	不詳。
----	-----

572 長果藤	<i>Aeschynanthus acuminatus</i> Wall. ex A. DC.	苦苣苔科 Gesneriaceae
別名	白面風、芒毛苣苔。	
分布	台灣低、中海拔山區之樹上或岩石上，中國南部、東南亞各國等。	
形態	常綠攀緣木質蔓藤。莖具不定根，藉以攀緣，老莖灰白色，嫩莖綠色，光滑無毛。單葉，對生，革質，略帶肉質；橢圓形或披針形；長 4~12cm，寬 2~3cm；基部楔形或狹楔形，先端漸尖；全緣，略反捲；表面深綠色，背面淡綠色，兩面光滑無毛。花兩性，聚繖花序，腋生或假頂生，具長梗，具苞片；花萼紅色，5 全裂至基部，反捲；花冠筒狀，淡綠色或帶黃紅色，2 唇形，上唇 2 裂，下唇 3 裂；雄蕊 4，2 長 2 短，伸出花冠；花絲被毛；子房上位；花柱棒狀；柱頭頭狀。蒴果細長圓柱狀，長 10~16cm。	
採集	全年採集全草，乾品。	
功效	全草具祛風、解毒、止血之效。(甘偉松，1981)	
主治	1、全草為產婦去風藥。(甘偉松，1981) 2、全草治產婦風熱、牛中暑等。(邱年永等，1983) 3、全草治風濕症關節炎、中暑、血濁、婦人風濕症等。(吳進錫，1979)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	

573 角桐草	<i>Hemiboea bicornuta</i> (Hayata) Ohwi	苦苣苔科 Gesneriaceae
別名	台灣半蒴苣苔、玲瓏草。	
分布	台灣低、中海拔山區之陰濕地，琉球西南部等。	
形態	多年生草本。全株光滑無毛，肉質；株高 50~100cm。莖直立，具紅褐色斑點。單葉，對生，肉質；長橢圓形；長 10~20cm，寬 3~6cm；基部狹楔形，先端漸尖尾狀；葉緣具細鋸齒；兩面光滑無毛。花兩性，單生或聚繖花序，腋生或假頂生；花萼鐘形，5 全裂；花冠筒狀，白色，內面具褐色斑點，被長毛；雄蕊 4，2 長 2 短，長者能育，短者不育；子房上位；花柱棍棒狀；柱頭頭狀。蒴果長角狀，略彎，長 2.5~3cm，熟時半開裂。	
採集	夏季、秋季採集全草，鮮品或乾品。	

功效	1、根為強建藥、清火解毒藥。(吳進錫，1981) 2、全草具清熱、解毒、生津、止血、止咳、利尿之效。(邱年永等，1995)
主治	1、根治心火內傷等。(吳進錫，1981) 2、葉治癰瘡腫核等。(吳進錫，1981) 3、全草治高血壓等。(吳進錫，1981)
毒性	不詳。
禁忌	胃虛者勿鮮用。(吳進錫，1981)

574 石吊蘭	<i>Lysionotus pauciflorus</i> Maxim.	苦苣苔科 Gesneriaceae
別名	紫背金盤。	
分布	臺灣低、中海拔山區，中國中部及南部、日本等。	
形態	常綠小灌木；株高 20~30cm，具塊根。莖淡灰褐色。單葉，對生或輪生；長橢圓狀披針形；長 3~6cm，寬 0.8~1.5cm；基部楔形或鈍形，先端鈍形或銳形；兩面光滑無毛；疏鈍鋸齒緣；主脈於背面凸起；具短柄，紫紅綠色。花兩性，聚繖花序，腋生或頂生，花梗長約 1cm；花萼深 5 裂，裂片狹披針形；花冠筒狀，綠白色或淡紅色，長約 5cm，中部膨脹，2 唇形，先端 5 裂；雄蕊 4，發育、退化各 2；雌蕊 1；子房上位；柱頭長曲折狀尖形。蒴果線形，長 6~10cm，徑約 0.3cm。	
採集	全年採集全草。	
功效	全草具清肺祛痰、涼血止血、去濕化滯、通絡止痛等之效。(邱年永等，1986)	
主治	全草治肺熱咳嗽、淋巴結核、慢性支氣管炎、風濕痹痛、跌打損傷、吐血、腰膝疼痛、婦女崩漏、小兒疳積、菌痢、皮膚化膿性感染等。(邱年永等，1986)	
毒性	無。	
禁忌	不詳。	

575 尖舌草	<i>Rhynchoglossum obliquum</i> Blume var. <i>hologlossum</i> (Hayata) W. T. Wang	苦苣苔科 Gesneriaceae
別名	琉璃苣苔。	
分布	特產台灣中、南部低至中海拔山區。	
形態	一年生草本。株高 40~50cm。莖光滑或疏被柔毛。單葉，互生；卵形；長 3~11cm，寬 2~5cm；基部歪斜，一側半心形，一側楔	

	形，先端銳尖；全緣；具緣毛；葉柄長 0.2~3.5cm。花兩性，總狀花序，頂生，花軸被毛；花萼鐘形，5 裂，裂片披針形；花冠筒狀，藍色，2 唇。蒴果卵形。
採集	夏季、秋季採集全草。
功效	全草具清熱、利尿、止血、解毒之效。(邱年永等，1995)
主治	全草治肝炎、甲狀腺腫大、糖尿病等。(邱年永等，1995)
毒性	無。
禁忌	不詳

576 同蕊草	<i>Rhynchotechum discolor</i> (Maxim.) B. L. Burtt	苦苣苔科 Gesneriaceae
別名	異色線柱苣苔、爛糟。	
分布	台灣低、中海拔山區之陰濕地，中國南部、菲律賓北部、日本南部等。	
形態	多年生灌木狀草本。株高 20~50cm，幼株密被黃褐色茸毛。莖基部平臥，上部直立或斜升，被貼伏狀褐色毛。單葉，互生，紙質；長橢圓形；長 10~20cm，寬 2~5cm；基部狹楔形，先端銳尖；葉緣具細鋸齒；背面灰褐色或黃褐色。花兩性，聚繖花序，2~4 回分枝，頂生或側生，花小而多數；花萼鐘形，5 深裂，被毛；花冠鐘形，白色，5 裂；雄蕊 4，同型，有孕，另具不孕性退化雄蕊 1；子房上位，卵圓形。漿果近球形，徑 0.5~0.7cm，熟時白色，內藏多數種子。	
採集	全年採集全草，鮮品或乾品。	
功效	全草具清熱、利尿、解毒、鎮靜之效。(邱年永等，1995)	
主治	全草治尿毒症、糖尿病、甲狀腺腫大、失眠、咳嗽等。(邱年永等，1995)	
毒性	不詳。	
禁忌	不詳。	

577 俄氏草	<i>Titanotrichum oldhamii</i> (Hemsl.) Soler.	苦苣苔科 Gesneriaceae
別名	台閩苣苔。	
分布	台灣低、中海拔山區之陰濕地，中國南部、琉球等。	
形態	多年生草本。株高 40~80cm，全株被毛。莖單一，直立或向光性之彎曲。單葉，對生，略肉質；潤橢圓形或長卵形；長 10~20cm，寬 5~10cm；基部楔形或歪斜，先端鈍尖；葉緣具疏鋸齒；兩面	

		被短毛。花兩性，總狀花序，頂生，具苞片和小苞片，花下垂；花萼鐘形，5 深裂；花冠筒狀，鮮黃色，上部 2 唇裂，上唇 2 裂，裂片內側具紫紅色斑點；雄蕊 4，能育，另具 1 不育退化雄蕊；子房上位，卵形，被毛。蒴果卵形，熟時褐色。
採	集	夏季、秋季採集全草。
功	效	全草具清熱、解毒、平肝、止血之效。(邱年永等，1995)
主	治	全草治肝病、淋病、瘡癤、咳血等。(邱年永等，1995)
毒	性	不詳。
禁	忌	不詳。

578		列當科
野	菰	<i>Aeginetia indica</i> L.
別	名	番仔烟斗、金鎖匙。
分	布	台灣低海拔山區，亞洲熱帶與溫帶地區等。通常寄生在禾本科植物的根部，尤其喜好以芒草屬、狗尾草屬及甘蔗屬的植物為寄主。
形	態	一年生寄生草本。莖短小，單一或有少數分枝，大部分藏於地下，地上部分極少。鱗片狀葉狹三角形。夏至秋季開花，由地下莖中伸出，高可達 25cm 左右，全體呈紅紫色或紫褐色，梗與花互相垂直，形如烟斗，故有「番仔烟斗」之別名；花冠管狀花萼佛焰苞狀；雄蕊 4，著生於花管近基部處；花藥成對黏合，僅 1 室發育，近下唇 1 對之基部延長成距；柱頭盾形。蒴果卵狀球形。
採	集	春季末至秋季採集全草。
功	效	全草具清熱涼血、消腫解毒、疏肝軟堅之效。(李勉民，1994)
主	治	全草治頭瘡、扁桃腺炎、咽喉炎、咳嗽、肝炎黃疸、腸炎、骨髓炎、胃腸炎、吐血、流鼻血、腎虛、小兒疳積、神經衰弱、風濕症、尿道感染、甲狀腺腫、疔瘡及毒蛇蟲傷等。(李勉民，1994)
毒	性	微毒。
禁	忌	泄瀉或腎中有熱者勿用。(李勉民，1994)

579		列當科
列	當	<i>Orobanche coerulescens</i> Stephan
別	名	紫花列當、鬼見愁、兔子拐杖。
分	布	台灣海岸至高海拔山區之草生地，中國、日本、韓國、歐洲、



	西伯利亞、蒙古、蘇聯、尼泊爾等。
形態	一年生寄生草本。株高 12~40cm，直立不分叉，全株密被白色絨毛。具地下塊莖，肉質，粗厚肥大，單一不分叉，暗黃褐色。葉肉質；鱗片狀披針形；互生；先端銳尖；長 0.8~2cm。花兩性，穗狀花序，頂生，密集，佔莖約 1/3~1/2；花藍紫色，下部筒狀，上部略彎曲，具 2 唇，上唇寬，2 裂，下唇 3 裂。蒴果 2 裂，卵狀橢圓形，具多數種子。
採集	春季、夏季採集全草，乾品。
功效	1、全草具補腎、強筋之效等。(邱年永等，1983) 2、全草具補腎、助陽、強筋之效等。(李永春等，2001)
主治	1、全草治腎虛腰膝冷痛、陽萎、遺精等。(李永春等，2001) 2、全草治腸炎、腹瀉、陽事不興等。(邱年永等，1983) 3、全草治瘧疾、神經錯亂、膀胱炎等。(江蘇新醫學院，2005)
毒性	不詳。
禁忌	不詳。

580 苦檻藍	<i>Myoporum bontioides</i> (Sieb.et Zucc.) A.Gray	苦檻藍科 Myoporaceae
別名	甜藍盤。	
分布	台灣西海岸、澎湖，中國南部、日本、琉球等。	
形態	常綠灌木。株高可達 1.5m。單葉，互生或叢生枝梢，肉質；倒披針形至長橢圓形；長 6~10cm，寬 2~3cm；側脈於表面凸起明顯；全緣或淺鋸齒緣。花兩性，2~3 朵簇生葉腋；花冠淡紫色，帶深紫色斑點，漏斗狀鐘形，5 裂。核果球形，先端具宿存花柱，基部具宿萼片。	
採集	全年採集根、枝。	
功效	根、枝具驅風、解毒之效。(邱年永等，1983)	
主治	根、枝治風濕症、肺疾等。(邱年永等，1983)	
毒性	無。	
禁忌	不詳。	

## 伍、結論

本研究將繼續查考森林野生藥用植物，拍攝珍貴照片，彙集作為未來分門別類出版之用。

## 陸、引用文獻

- 中國生草藥研究發展中心（1991） 民間中草藥大集。總領出版社。
- 台灣植物誌第二版編輯委員會（1993-2003） 台灣植物誌，第二版 1-6 冊。
- 甘偉松（1981）藥用植物學 國立中國醫藥研究所
- 甘偉松（1985）台灣藥用植物誌，上卷。國立中國醫藥研究所。
- 江蘇新醫學院（2005） 中藥大辭典 上、下冊。上海科學技術出版社。
- 吳進錫（1979-1984） 原色圖譜中國本草 1-3 冊。南天書局。
- 李永春、吳衣馨、邵孝慈、張瑞珍、劉淑貞（2001）實用中醫辭典。知音出版社。
- 李世文、康滿珍、李億（2005）一味中藥祛頑疾，第二版。人民軍醫出版社。
- 李勉民（1994）常見藥草圖說。讀者文摘。
- 於達望（1987） 國藥提要。大孚書局。
- 林國華（1987-1997） 常見中草藥 1-7 冊。好兄弟出版社。
- 林余霖、李葆莉、林壽全、連文琰、劉玉琇、胡炳義、劉德旺、章國鎮（2002）常用青草藥手冊。福建科學技術出版社。
- 林宜信、邱年永、陳忠川、陳瓊雪、陳益昇、張賢哲、張永勳、張憲昌、廖江川、歐潤芝、謝文全、羅淑惠、謝伯舟、張麗晴（2003） 台灣藥用植物資源名錄。行政院衛生署中醫藥委員會。
- 邱年永（1993）高山藥用植物。南天書局。
- 邱年永、張光雄（1983-2001）原色台灣藥用植物圖鑑 1-6 冊。南天書局。
- 高木村（1996） 台灣民間藥 1-3 冊。南天書局。
- 黃兆勝、華碧春、 建春、成秉業、肖珊、張秋鎮、鄭荔軍、葛驕華（2004）中草藥與驗方。福建科學技術出版社。
- 張憲昌（1997） 藥草（一）、（二）。渡假出版社有限公司。
- 鄭炳全（1979-1981） 天然彩色台灣藥草 1-3 冊 南天書局。
- 劉業經、呂福原、歐辰雄（1994） 台灣樹木誌，修訂再版。國立中興大學農學院出版委員會。
- 謝明村、邱年永、謝文全、張賢哲、林景彬、廖江川、林文川、陳忠川、陳欽銘（1988）中國藥材學。國立編譯館。
- 蕭步丹（2003） 嶺南采藥錄。萬里書店。
- 譚樹輝、潘超美（2004-2005） 中草藥野外識別手冊 1-3 冊。西北出版社。
- 羅獻瑞、黃淑美、吳德鄰、程用謙、林有潤、衛兆芬、陳邦余、阮雲珍、劉明（2001-2003）實用中草藥彩色圖集 1-6 冊。廣東科技出版社。