

《臺灣維管束植物野外鑑定指南》上冊 勘誤表 110.01.18

P.52

5	走莖上鱗片寬卵形，早落；葉片近軸面僅葉軸與羽軸有毛		<i>Goniophlebium formosanum</i>	臺灣水龍骨	LC
-	走莖上鱗片寬卵形，具長尾，通常宿存；葉片近軸面具毛		<i>Goniophlebium raishaense</i>	大葉水龍骨*	LC
6	無獨立羽片		<i>Goniophlebium amoenum</i>	阿里山水龍骨	LC
-	最基部幾對羽片獨立，無翅狀葉肉相連		<i>Goniophlebium fieldingianum</i>	栗柄水龍骨	VU

P.108

1	葉明顯呈螺旋狀扭曲		<i>Vallisneria spiralis</i>	旋葉苦草#	NA
-	葉不成或略螺旋狀扭曲	2			
2	葉片寬可達 1.5 cm		<i>Vallisneria americana</i>	美洲苦草#	NA
-	葉片寬<1 cm		<i>Vallisneria gigantea</i>	大苦草	DD

P.120

8 3	唇瓣前端形成一線形漸尖的條帶		<i>Hylophila nipponica</i>	蘭嶼袋唇蘭 (蘭嶼光唇蘭)(袋唇蘭屬)	NT
-	唇瓣前端不形成條帶	84			

P.124

<i>Aphyllorchis</i> 無葉蘭屬檢索表					
1	唇瓣沒有花瓣化，邊上的肉突明顯		<i>Aphyllorchis montana</i>	紫紋無葉蘭	LC
-	唇瓣花瓣化或花瓣化過程中	2			
2	唇瓣已完全花瓣化		<i>Aphyllorchis montana</i> var. <i>rotundatipetala</i>	圓瓣無葉蘭	DD
-	唇瓣花瓣化過程中，邊上的肉突已消失		<i>Aphyllorchis montana</i> var. <i>membranacea</i>	薄唇無葉蘭	DD

P.124

<i>Appendicula</i> 竹葉蘭屬檢索表					
1	莖短於 15 cm		<i>Appendicula reflexa</i> var. <i>kotoensis</i>	蘭嶼竹節蘭*	VU
-	莖長過 15 cm	2			
2	莖有分枝		<i>Appendicula lucbanensis</i>	多枝竹節蘭	CR
-	莖不分枝	3			
3	葉 2 列互生，2.5–4 × 1–1.5 cm，橢圓形或長橢圓形		<i>Appendicula reflexa</i> var. <i>reflexa</i>	臺灣竹節蘭*	LC
-	葉 2 列互生，約 5 × 1 cm，披針形，頂銳尖		<i>Appendicula fenixii</i>	長葉竹節蘭	NT

## P.124

<i>Brachycorythis</i> 苞葉蘭屬檢索表					
1	唇瓣白色帶有紫色條紋，倒三角形中央凹入		<i>Brachycorythis galeandra</i>	寬唇苞葉蘭	CR
-	唇瓣白色，倒卵形至圓形，先端尖銳		<i>Brachycorythis peitawuensis</i>	北大武苞葉蘭*	DD

## P.124

<i>Bulbophyllum</i> 豆蘭屬檢索表					
1	植物體不具假球莖	2			
-	植物體具假球莖	6			
2	不具有地下莖；葉子密集		<i>Bulbophyllum pauciflorum</i>	非豆蘭(白花豆蘭)	CR
-	具有地下莖	3			
3	每花序花單一		<i>Bulbophyllum somae</i>	狹萼豆蘭	
-	每花序具 2 或 3 朵花	4			
4	葉子橢圓形，1-2 cm 長；花 2-3 朵		<i>Bulbophyllum aureolabellum</i>	小豆蘭*	LC
-	葉子圓形至橢圓形，< 1 cm 長；花通常 2 朵	5			

## P.167

6	外稃邊緣平滑，芒於外稃先端稍下方長出		<i>Bromus hordeaceus</i>	毛雀麥#	NA
-	外稃邊緣具纖毛，芒於外稃先端長出		<i>Bromus pubescens</i>	短毛雀麥#	NA
7	外穎 1 脈；外稃先端部份光滑無毛，基部疏被毛；芒與外稃近等長		<i>Bromus morrisonensis</i>	玉山雀麥	LC
-	外穎 3 脈；外稃密被毛，芒長<外稃長 1/2		<i>Bromus formosanus</i>	臺灣雀麥*	NT

## P.170

<i>Echinochloa</i> 稗屬檢索表					
1	栽培作物；小穗明顯卵形；穎果成熟時不脫落		<i>Echinochloa frumentacea</i>	稗子#	NA
-	野生植物；小穗卵形、卵狀披針形或卵狀橢圓形；穎果成熟時脫落	2			
2	總狀花序彼此疏遠，小穗近乎等長；小穗無芒，銳尖，長 2-3 mm		<i>Echinochloa colona</i>	芒稷	LC
-	總狀花序接近，上位小穗長<下位小穗長；小穗漸尖至具短芒，長 2-4 mm		<i>Echinochloa crus-galli</i>	稗	LC

## P.173

<i>Eulalia</i> 金茅屬檢索表					
1	植株具纖細伸展的匍匐走莖，秆高 0.3-0.7 m；小穗長 3-3.5 mm		<i>Eulalia leschenaultiana</i>	細稗金茅	EN
-	植株從短而有鱗片的地下莖叢生，秆高 0.7-2 m；小穗長 4.5-6 mm	2			
2	基部的葉鞘膨大，被金黃色毛		<i>Eulalia quadrinervis</i>	四脈金茅	CR
-	基部的葉鞘不膨大，無金黃色毛		<i>Eulalia speciosa</i>	金茅	CR

《臺灣維管束植物野外鑑定指南》下冊 勘誤表 110.01.18

P.264

Vernonia 斑鳩菊屬檢索表					
1	莖攀緣性	2			
-	莖直立或斜上	3			
2	葉近革質；每枚頭花具小花約 10 朵；果實被腺體；冠毛淡黃褐色，長 0.4-0.45 cm		<i>Vernonia elliptica</i>	光耀藤#	NA
-	葉紙質；每枚頭花具小花約 5 朵；果實被毛；冠毛紅褐色，長 0.9-1.1 cm		<i>Vernonia gratioiosa</i>	過山龍	LC
3	果實密被毛；冠毛 2 層	4			
-	果實無毛；冠毛 1 層	5			
4	總苞與內層冠毛長約 0.4-0.5 cm		<i>Vernonia cinerea</i> var. <i>cinerea</i>	一枝香	LC
-	總苞與內層冠毛長約 0.3-0.35 cm		<i>Vernonia cinerea</i> var. <i>parviflora</i>	小花斑鳩菊	LC
5	植株基部木質化，高約 10 cm		<i>Vernonia maritima</i>	濱斑鳩菊	VU
-	草本，高 35-70 cm		<i>Vernonia patula</i>	嶺南野菊	LC

P.270

Trichodesma 碧果草屬					
1	灌木，葉長>10 cm		<i>Trichodesma calycosum</i>	假酸漿	LC
-	草本，葉長<10 cm	2			
2	葉呈披針形至長披針形		<i>Trichodesma indicum</i>	印度碧果草#	NA
-	葉呈卵形至菱形		<i>Trichodesma zeylanicum</i>	斯里蘭卡碧果草#	NA

P.272

15	莖及果實有稜角；果實微扁；蒴片具 1 明顯脈		<i>Barbarea</i>	山芥屬	
-	莖及果實圓形；蒴片主脈不明顯或為 3 條明顯脈	16			
16	果實長>2 cm		<i>Sisymbrium</i>	掃娘蒿屬	
-	果實長<2 cm		<i>Rorippa</i>	葶藶屬	

## P.279

Patrinia 敗醬屬檢索表				
1	葉不裂	2		
-	葉羽狀深裂	3		
2	莖密被倒生毛；葉兩面被短毛		<i>Patrinia formosana</i>	臺灣敗醬* LC
-	莖密被平展毛；葉兩面光滑		<i>Patrinia glabrifolia</i>	禿敗醬* LC
3	莖上部光滑；莖生葉柄基部抱莖		<i>Patrinia scabiosifolia</i>	黃花龍芽草 LC
-	莖上部密被短毛；莖生葉柄不抱莖		<i>Patrinia villosa</i>	毛敗醬 LC

## P.453

18	枝條及葉背被短絨毛；花序軸長>2 cm		<i>Symplocos formosana</i>	臺灣灰木 LC
-	枝條及葉密被褐色長絨毛；花序軸長<2 cm		<i>Symplocos trichoclada</i>	褐毛灰木 LC
19	穗狀花序，花序軸長而明顯；核果壺形	20		
-	花序壓縮呈簇，花序軸極短或不可見；核果卵形或圓筒狀	24		
20	嫩枝綠色，光滑	21		
-	嫩枝灰色或褐色，被毛	22		
21	葉倒卵形至倒披針形，先端凸尖，上表面霧綠色		<i>Symplocos konishii</i>	小西氏灰木 LC
-	葉披針形，先端漸尖，兩面光亮，上表面網脈明顯凹陷		<i>Symplocos acuminata</i>	大里力灰木 LC
22	小枝及葉密被褐色細柔毛；嫩芽粉紫色		<i>Symplocos cochinchinensis</i> var. <i>cochinchinensis</i>	鏽葉灰木 LC
-	小枝及葉近光滑或被稀疏柔毛；嫩芽深紫色至淺綠色	23		
23	葉寬橢圓形至卵形，兩面光亮；花萼密被褐色細絨毛		<i>Symplocos cochinchinensis</i> var. <i>philippinensis</i>	蘭嶼鏽葉灰木 LC
-	葉橢圓形；花萼光滑		<i>Symplocos theophrastifolia</i>	山豬肝 LC
24	花密生於葉腋；核果圓筒狀		<i>Symplocos congesta</i>	楊桐葉灰木 LC
-	花密生於樹幹或枝條上；核果卵形至橢圓形	25		
25	葉長<20 cm，葉背無毛	26		
-	葉長>20 cm，葉背密被褐色絨毛		<i>Symplocos koshunensis</i>	恆春灰木* EN
26	葉背密被乳頭狀附屬物，葉緣不反捲	27		
-	葉背無乳頭狀附屬物，葉上表面網脈凹陷，葉緣通常反捲		<i>Symplocos stellaris</i>	枇杷葉灰木 LC
27	葉狹橢圓形或狹卵形，葉上表面網脈不凹陷		<i>Symplocos glauca</i>	山羊耳 LC
-	葉狹倒卵形，葉上表面網脈凹陷		<i>Symplocos grandis</i>	大葉灰木 VU

